Monitorage hémodynamique par échographie cardiaque

Dr Habiba BEN SIK ALI

*Collège de réanimation
médicale
« Module circulatoire »*

Le 06/06/2019

Vignette clinique

- Patient âgé de 72 ans, hypertendu et diabétique consulte aux urgences pour dyspnée avec toux et expectorations purulentes évoluant depuis 3 jours.
- A l'examen : $\Theta=39.5^{\circ}\text{C}$, patient somnolent (Glasgow à 13), $\text{PA}=87/48_{\text{mmHg}}$, $\text{FC}= 130_{\text{bpm}}$, marbrures au niveau des genoux, $\text{FR}= 36_{\text{cpm}}$, $\text{SpO}_2= 82\%$ à l'air ambiant, râles crépitants au niveau du champs pulmonaire droit.

Radiographie du thorax

Bilan

● **Bilan sanguin:** GB : 20 000 élém/mm³, Hb: 12 g/dl, Plaquettes: 130 000 élém/mm³, Na⁺ : 133 mmol/L, K⁺ : 4.8 mmol/L, Cl⁻ : 96 mmol/L, Glycémie : 18 mmol/L, Urée : 16 mmol/L, créatinine : 213 μmol/L, Bili totale: 44 μmol/L, TP : 100% .

● **GDS artériel sous MHC 10 l/min :** pH : 7.32, PaCO₂ : 22 mmHg, PaO₂ : 63 mmHg, HCO₃⁻ : 14 mmol/L, SaO₂ : 89% , Lactates: 5 mmol/l.

● **ECG :** ACFA à 130 cpm

Prise en charge initiale

- Remplissage par 2500 ml de sérum physiologique
- Antibiothérapie par Claforan-Tavanic
- IOT
- Noradrénaline devant une PAM < 65 mmHg malgré remplissage

Prise en charge initiale

- Remplissage par 2500 ml de sérum physiologique
- Antibiothérapie par Claforan-Tavanic
- IOT
- Noradrénaline devant une PAM < 65 mmHg malgré remplissage

Transfert en réanimation

A l'admission en réanimation

- PAM= 58 mmHg sous 6 mg/h de Noradrénaline
- Persistance des marbrures
- Anurie
- GDS artériel (FiO₂: 100%, PEEP: 8 cmH₂O): pH : 7.25, PaCO₂ : 48 mmHg, PaO₂ : 92 mmHg, HCO₃⁻ : 8 mmol/L, SaO₂ : 93%, Lactates: 6 mmol/l.

Radiographie du thorax à H6

Quelle serait votre conduite à tenir?

SDRA?

SDRA?

**Dysfonction
cardiaque
gauche?**

SDRA?

Hypovolémie?

**Dysfonction
cardiaque
gauche?**

**Remplissage
vasculaire?**

SDRA?

Hypovolémie?

**Dysfonction
cardiaque
gauche?**

Dobutamine?

Moyens

Moyens

● Test de lever de jambes

● ΔPP

● $SvO_2, \Delta PCO_2$

● Swan Ganz

● Picco

●

Moyens

● Test de lever de jambes

● ΔPP

● $SvO_2, \Delta PCO_2$

● **Echographie cardiaque**

● Swan Ganz

● Picco

●

Echocardiographie

- Basée sur la réflexion des ultrasons sur les structures cardiaques pour produire des images
- Approche **rapide, non invasive, reproductible avec cout faible**
- Résultats **instantanés**
- Evaluation du myocarde, des valves, du péricarde, des gros vaisseaux et de la précharge

Echocardiographie en réanimation

- **40%** des patients admis en réanimation ont une anomalie cardiaque échographique significative qui est ignorée par la clinique dans plus de **75%** des cas
- L'ETT permet d'exclure ou d'affirmer l'origine **cardiogénique** d'un état de choc avec une sensibilité, une spécificité, une VPN et VPP de 100%, 95%, 97% et 100% respectivement.

Echocardiographie en réanimation

- Appréciation de la **volémie**
- Diagnostic **OAP** cardiogénique vs lésionnel
- Adaptation des amines dans l'état de **choc septique**
- **SDRA**: dysfonction VD?

Pyramide des compétences d'échocardiographie en réanimation

Echocardiographie en réanimation

Quelques principes physiques

- **Production** d'ultra sons
- **Réflexion** sur les structures cardiaques
- Signal traduit par une **image visuelle**

Mouvements du capteur

- Rotation horaire ou anti-horaire
- Béquillage ou inclinaison vers le haut (ou antérieur), vers le bas (ou postérieur), vers la gauche (ou interne), vers la droite (ou externe).

Différentes modalités d'imagerie

- Uni dimensionnelle (TM)
- Bi dimensionnelle
- Doppler

Différentes modalités d'imagerie

● Mode temps-Mouvement (TM) ou unidimensionnel

■ Image obtenue par émission d'un seul ultrason ou ligne

appelée ligne TM

■ Etude des structures traversées par un tir ultrasonore

■ Etude de l'épaisseur des parois, diamètre des cavités ...

Différentes modalités d'imagerie

● Mode temps-Mouvement (TM) ou unidimensionnel

● Mode Bi dimensionnel:

■ Faisceau d'ultrasons composé de milliers de lignes

■ Etude: taille des cavités, structure et

fonctionnement des valves, mobilité

des parois

Différentes modalités d'imagerie

- Mode temps-Mouvement (TM) ou unidimensionnel
- Mode bi dimensionnel
- **Mode doppler:**
 - Analyse du déplacement des flux sanguins dans le cœur
 - Le sens de déplacement du sang, sa vitesse peuvent être déterminés

Doppler

Équation Doppler

$$V = \Delta F \times c / (2 \times F_e \times \cos \theta)$$

$$\Delta P = 4v^2$$

V: vitesse du flux sanguin

C: vitesse de propagation des ultrasons dans les tissus mous (1540 m/s)

ΔF : différence entre la fréquence émise (F_e) et réfléchié (F_r)

θ : angle entre le flux sanguin et l'ultrason émis

Doppler

Doppler

Doppler

Doppler

Doppler continu

- La sonde émet et analyse **en permanence** les signaux réfléchis
- Analyse de la vitesse sur toute la ligne d'émission **sans localisation** du flux
- Une ligne horizontale caractérise la vitesse 0:
 - Les flux se rapprochant de la sonde s'inscrivent positivement **AU DESSUS**
 - Les flux sanguins s'éloignant de la sonde s'inscrivent négativement **AU DESSOUS**

Doppler pulsé

- La sonde émet des ultra sons et **alternativement** reçoit des ultrasons réfléchis par les différents flux sanguins.
- **Analyse spatiale** et de la vitesse (permet de localiser les flux sanguins)

Doppler tissulaire

- Technique de **Doppler pulsé** avec des réglages particuliers des gains et des filtres
- Analyse non pas les flux mais les vitesses des mouvements des **parois cardiaques**.

Doppler couleur

- **Codage couleur:**

- Flux qui « vient » vers la sonde: **ROUGE**
- Flux qui « fuit » la sonde: **BLEU**

- **Permet de visualiser les fuites valvulaires, CIA, CIV**

Doppler couleur

Doppler couleur

Fenêtres acoustiques

Incidence para sternale grand axe

Incidence para sternale grand axe mode bi dimensionnel

Incidence para sternale grand axe mode bi dimensionnel

Incidence para sternale grand axe mode Temps-Mouvement (TM)

Incidence para sternale petit axe

Incidence para sternale petit axe

Incidence para sternale petit axe

Incidence para sternale petit axe

Incidence para sternale petit axe

Incidence apicale 4 cavités

Incidence apicale 4 cavités: mode bi dimensionnel

Incidence apicale 4 cavités: FEVG visuelle

Incidence apicale 4 cavités: FEVG visuelle

Incidence apicale 4 cavités: FEVG visuelle

Incidence apicale 4 cavités: FEVG « Simpson »

Incidence apicale 4 cavités: doppler couleur

Incidence apicale 4 cavités: doppler pulsé

Incidence apicale 4 cavités: doppler continu

Incidence apicale 5 cavités

VD

VG

OD

Aorte

OG

Incidence apicale 5 cavités

Incidence sous costale

Visualise bien le péricarde et le septum inter auriculaire

Incidence sous costale

De retour à notre patient

Remplissage
vasculaire?

SDRA?

Hypovolémie?

Dysfonction
cardiaque
gauche?

Dobutamine?

Evaluation de la fonction systolique du VG

De retour à notre patient

Remplissage
vasculaire?

SDRA?

Hypovolémie?

Dysfonction
cardiaque
gauche?

Dobutamine?

De retour à notre patient

Remplissage
vasculaire?

SDRA?

Hypovolémie?

~~Dysfonction
cardiaque
gauche?~~

~~Dobutamine?~~

De retour à notre patient

Vide?

Bien rempli?

En surcharge?

Veine cave inférieure

Indices en faveur d'une hypovolémie et d'une réponse probable positive au remplissage vasculaire

Un diamètre de la VCI < 10 mm est synonyme d'une pression auriculaire droite basse (< 10 mmHg ; spécificité 100 %) et d'une efficacité probable d'un remplissage vasculaire

Veine cave inférieure

Indices dynamiques permettant de sélectionner a priori les patients répondeurs au remplissage en ventilation contrôlée et sédatisés ($V_c > 6$ ml/kg et sans cycle spontané)

Indice de distensibilité de la VCI : en ETT en TM coupe sous-costale longitudinale

$$(VCI_{\max} - VCI_{\min}) \times 100 / (\text{moyenne } VCI_{\max} \text{ et } VCI_{\min}) > 12 \%$$

$$(VCI_{\max} - VCI_{\min}) \times 100 / VCI_{\min} > 18 \%$$

Flux aortique

Mesure des variations respiratoires du flux aortique.

Variations respiratoires du flux aortique : obtenues en Doppler pulsé

Non utilisable en arythmie

$$(V_{\max} - V_{\min}) \times 100 / (\text{moyenne } V_{\max} \text{ et } V_{\min}) > 12 \%$$

$$(VTI_{\max} - VTI_{\min}) \times 100 / VTI_{\max} > 20 \%$$

Flux mitral: facteurs de variation

- âge
- fréquence cardiaque
- conduction: AV - intraventriculaire
- pré / post charge
- fonction contractile OG
- volémie
- valvulopathies

Flux mitral

E: Remplissage rapide initial

Relaxation

A : Remplissage rapide terminal
Systole atrial
Rythme sinusal

Compliance

Anomalie de relaxation

$$E/A < 1$$

$$TD > 220 \text{ ms}$$

Anomalie de type restrictif « diminution compliance »

$$E/A > 2$$

$$TD < 150 \text{ ms}$$

Vit. max E	98.0cm/s
Vit. max A	40.0cm/s
Temps de décél.	99ms
TMP	29ms
IVT	
IVRS	
Vmax	98.0cm/s
GrMx	3.8mmHg
Surf. VM	7.6cm ²
Temps acc	
E/Ea	
Am-Ap	
*	111.00ms
	1.87cm/s
	16.85cm/s ²

$$E/A = 2.4$$

Flux mitral: E/A et FE

flux mitral

$E > A$ - $E < A$

FE

$\geq 45\%$ - $< 45\%$

Pressions de remplissage: méthode d'évaluation

$E < A$ et

$E < 50$ cm/s

**Pressions de
remplissage
normales**

Pressions de remplissage: méthode d'évaluation

$E > A$

$FE < 45\%$

$E/A > 2$
et/ou
 $TDE < 150$ ms

Pressions élevées

Pressions de remplissage: méthode d'évaluation

Doppler tissulaire: E_a

Doppler tissulaire: vitesse déplacement anneau mitral

Ea: N > 8 cm/s

Ea/Aa > 1

Pressions de remplissage: méthode d'évaluation

Zone « grise »?

Zone « grise »: flux veineux pulmonaire

Zone « grise »: vitesse de propagation du flux mitral (VP)

Cœur pulmonaire aigu

Cœur pulmonaire aigu

- ✓ Dilatation des cavités droites avec rapport VD/VG > 0.6
- ✓ Septum paradoxal
- ✓ HTAP
- ✓ Ouverture d'un foramen oval

Incidence apicale 4 cavités

Incidence apicale 4 cavités

Incidence para sternale petit axe

Incidence para sternale petit axe

FOP

Embolie pulmonaire: échographie cardiaque