Œdème Aigu Du Poumon Hémodynamique

Collège Réanimation médicale
10/03/2023

Pr Ag Guissouma J
Hôpital Universitaire Habib Bougatfa Bizerte

Oedème pulmonaire

ESC

European Society
of Cardiology

European Heart Journal (2021) 42, 3599–3726
doi:10.1093/eurheartj/ehab368

ESC GUIDELINES

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)

Introduction

L'OAP hémodynamique est une cause fréquente d'IRA pouvant mettre en jeu le pronostic vital à court terme par son caractère asphyxique → La mortalité hospitalière varie de 4 à 10%

C'est l'accumulation rapide et anormale de l'eau extravasculaire pulmonaire d'abord dans l'interstitium puis dans les alvéoles

L'OAP cardiogénique en est la pathologie la plus fréquente

→ survenant de novo ou le plus souvent comme une décompensation d'une IC chronique

OAP / Syndrome d'Insuffisance cardiaque aiguë

SICA → 5 scénarios

Scénarios	Fréquence	Profils cliniques
1. PAS > 140 mmHg	~50%	<ul style="list-style-type: none">• Apparition brutale• Œdème pulmonaire diffus
2. PAS 100-140 mmHg	~40%	<ul style="list-style-type: none">• Apparition progressive• Œdèmes systémiques prédominants
3. PAS < 100 mmHg	< 10%	<ul style="list-style-type: none">• Apparition brutale ou progressive• Congestion souvent peu marquée• Détecter hypoperfusion
4. Syndrome coronarien aigu	~20%	<ul style="list-style-type: none">• Apparition brutale• DRS/signes ECG d'ischémie• élévation significative troponine
5. Insuffisance ventriculaire droite isolée	~3%	<ul style="list-style-type: none">• Apparition brutale ou progressive• Signes de congestion veineuse systémique• Symptômes gastro-intestinaux

OAP / Insuffisance cardiaque aiguë

SICA : 5 classes

Physiopathologie

- Le flux net du liquide sortant du capillaire obéit à

l'équation de Starling

$$Q_f = K [(P_{cap} - P_{int}) - (\pi_{cap} - \pi_{int})]$$

Q_f : débit de filtration de memb alv-cap

K : coefficient de perméabilité

P : pression hydrostatique

π : pression oncotique

Cap: capillaire

Int : interstitielle

Physiopathologie

A l'état physiologique le **bilan des forces** résulte en :
un flux net du liquide du capillaire vers l'interstitium

Cependant il n'y aura **pas d'oedeme** car le **drainage** est simultanément assuré par la circulation **lymphatique** pulmonaire

Physiopathologie :

La membrane alvéolo-capillaire est intacte

Le liquide accumulé dans les alvéoles est un transsudat pauvre en protéines et cellules sanguines

Physiopathologie : mécanismes initiateurs

l'équation de Starling

$$Q_f = K [(P_{cap} - P_{int}) - (\pi_{cap} - \pi_{int})]$$

Augmentation de la pression hydrostatique capillaire > 25 mmHg

Diminution de la pression hydrostatique interstitielle → OAP à vacuo

Diminution de la pression oncotique capillaire : situation rare due à une importante hypoprotidémie (ice hep, sd nephrotique..)

Diminution du drainage lymphatique : très rare due à un obstacle mécanique (lymphangite carcinomateuse) ou fonctionnel (Ice Cdte)

Physiopathologie : mécanismes initiateurs

Augmentation de la pression hydrostatique capillaire > 25 mmHg

Conséquences physiopathologiques

Respiratoires

Altération de la mécanique ventilatoire

Sd restrictif

↘ de la compliance pulmonaire

↗ des Rces pulmonaires

↗ du W resp
↗ de la consommation d'O₂
Fatigue + dyspnée

Altération des échanges gazeux

Effet shunt : due à l'inondation des alvéoles et des bronchioles

Effet espace mort : par redistribution de la V° vers les territoires mieux aérés

Hypoxémie
↗ lactate
Hypercapnie
Acidose

Conséquences physiopathologiques

Hémodynamiques

HTAP post capillaire

Dysfonction VD
Puis Dilatation VD

Passive :

Par transmission rétrograde de la Pression de l'OG

Aggravée par l'hypoxémie et la compression des Vx par l'oedeme

Réactive :

Par $\nearrow$ de la PAPO IIre aux phénomènes de Vasoconstrict °ou de remodelage des AP en cas d'Ice C Chr

Signes de congestion :

OMI
TSJ
RHJ
hepatalgies

Diagnostic Positif

Anamnèse

- **ATCDs** : cardiopathie, valvulopathies, HTA...
- **Mode de début** : dyspnée brutale souvent nocturne type orthopnée
- **Symptomatologie** :
 - Toux quinteuse + grésillement laryngé
 - Expectorations mousseuses blanchâtres ou rosées
 - Angoisse
 - Sensation d'oppression thoracique
- Signes en rapport avec l'étiologie : Dr thoraciques, Palpitations, céphalées...

Diagnostic Positif

Signes cliniques

Respiratoires :

- Polypnée, orthopnée
- Cyanose
- Signes de lutte
- Râles crépitants bilatéraux
- Râles sibilants/ronflants parfois

Hémodynamiques :

- Tachycardie
- **PA** element dg et pc :
 - ↗ PA: cause ou hyperadrénergisme
 - ↘ PA: choc cardiogénique
- **AC**: galop, SS (IM), RD (RM)

Neurologiques :

- Agitation
- Altération de l'état de conscience

Diagnostic Positif

Signes de gravité

-Tachypnée
-Bradypnée
-Signes de
lutte

-PAS $\leq$ 110
-Marbrures

-Tb de la
conscience

-Rapidité de
la
détérioration
clinique

Diagnostic Positif

Examens complémentaires

ECG

- Tachycardie sinusale quasi constante
- Bradycardie: S gravité/ patient ss betaB
- Dg étiologique : SCA, tr rythme, HVG...

Rx Thorax

Au Lit

- Lignes de kerley stade d'oedeme interstitiel
- Infiltrats péri-hilaires, opacités alvéolaires floconneuses confluentes en ailes de papillon
- A l'extreme poumons blancs
- Cardiomégalie, silhouette mitrale

Lignes de Kerley B

Image en ailes de Papillon

Syndrôme alvéolaire diffus

↔ Cardiomégalie

Signes spécifiques ($Sp > 93\%$) mais peu Sensibles ($Se = 25\%$)

Fig. 4 Aspects radiographiques des signes retrouvés dans les SICA (iconographies des auteurs)

Diagnostic Positif

Examens complémentaires

GDS

- Hypoxémie
- Hypocapnie
- Hypercapnie Acidose resp, métabolique ou mixte
- → **S Gravité**

Biologie

- Hémococoncentration : $\nearrow$ Hte, PT, urée
- Hyperadrénergisme : $\nearrow$ Gmie, $\nearrow$ GB, $\searrow$ K
- Hypoperfusion tissulaire : $\nearrow$ lactates
- Biomarqueurs cardiaques : Trop US SCA?
- NT proBNP/Pro BNP : utiles si doute dg

Diagnostic Positif

Examens complémentaires

Echo

Pleuro-
pulmonaire

- Excellente sensibilité et spécificité

ETT

- Evalue :
- → la FEVG, P° remplissage,
- → P° pulmonaires
- → La volémie
- → la cause de l'OAP: Tr cinétique segmentaire SCA, Tr cinétique globale (myocardite), valvulopathie...

Diagnostic Positif

Examens complémentaires : Echo Pleuro-pulmonaire

Aération normale:
lignes A et
glissement pleural

Perte modérée de l'Aération :
lignes B multiples et bien espacées

Perte sévère de l'Aération :
lignes B multiples et confluentes

Absence d'Aération :
consolidation pulmonaire naissant de la ligne pleurale

Diagnostic workup of new onset acute heart failure

Patient history, signs and/or symptoms suspected of acute HF

- Electrocardiogram
- Pulse oximetry
- Echocardiography
- Initial laboratory investigations^a
- Chest X-ray
- Lung ultrasound
- Other specific evaluations^b

Natriuretic peptide testing

- BNP < 100 pg/mL
- NT-proBNP < 300 pg/mL
- MR-proANP < 120 pg/mL

Acute heart failure ruled out

- BNP ≥ 100 pg/mL
- NT-proBNP ≥ 300 pg/mL^c
- MR-proANP ≥ 120 pg/mL

Acute heart failure confirmed

Comprehensive echocardiography

Formes cliniques symptomatiques

Suraigues:

- Bronchoplégiques
- EDC cardiogénique
- foudroyante
- Mortelles

Trompeuses

- Asthmatiforme
- Hémoptoïque (EP?)
- Douloureuses (SCA)
- Avec pleurésie

Mineures

- RM
- Symptomes paroxystiques liés à l'effort

Subaigues

- Symptomes permanents
- Ice C ch

Formes étiologiques

+ IVG

- Cardiopathie ischémique+/-
Complication mécanique
- Cardiopathie hypertensive 1^{ère} cause d'OAP**
- Cardiopathies valvulaires chroniques
→ Iao, Rao, IM : indication chirurgicale
- cardiomyopathies
- Tr rythme

RM

- 2^{ème} cause d'OAP**
- Roulement diastolique au foyer mitral
- Eclat de B1
- Rx Thx: silhouette mitrale
- ETT : confirme le dg évalue le degré de la sténose
→ ttt chgic urgente

Prise en charge thérapeutique

Corriger
l'hypoxémie et
ses
conséquences

Améliorer la
fonction
cardiaque

Traiter la cause

**Prévenir les
récidives**

Prise en charge thérapeutique

Profils cliniques selon la présence ou non de congestion/hypoperfusion

Prise en charge thérapeutique

Prise en charge thérapeutique :

Ttt symptomatique
Ventilatoire

Oxygénothérapie
en VS

- débit 6 à 8l/mn
- → objectifs SpO₂>92% et PaO₂>60mmHg

CPAP

- VS+PEEP :7,5 à 10cm H₂O
- Modalité de 1^{ère} intention en dehors de la Réa
- Effets respiratoires et hémodynamiques

Prise en charge
thérapeutique :

Ttt symptomatique
Ventilatoire

VNI: BPAP

- **Formes graves avec**
- → Hypercapnie > 45 mmHg ou
- → persistance IRA malgré ttt médical bien conduit
- **Après avoir éliminer un SCA**
- **Réglages:**
- → AI 6 à 8 cm H₂O
- → PEEP ≤ 10 cm H₂O
- → objectifs VT 6 à 8 ml/kg
- **Séance de 45mn à 1h puis espacées**

Prise en charge
thérapeutique :

Ttt symptomatique
Ventilatoire

Ventilation
Invasive

- **Indications :**
- → Echec de la VNI et du ttt médical
- → IRA d'emblée grave
- → CI à la VNI : ACR , EDC, Tr de la conscience, Coma
- **Réglages : VAC**
- → VT: 6 à 8ml/Kg
- → FR: 14 à 16 cpm
- → PEEP $\leq$ 10

Prise en charge thérapeutique :

Ttt symptomatique
médicamenteux

Médicament	Effets Thérapeutiques	Posologie
Morphine	<ul style="list-style-type: none">- Effet anxiolytique : $\searrow$ dyspnée et FC- Effet vasodilatateur : artériel et veineux <p>→ Déconseillée car Risque de dépression respiratoire : réservée aux formes hyperalgiques sous une bonne surveillance</p>	2 à 5 mg IVL en bolus à renouveler si nécessaire

Prise en charge thérapeutique :

Ttt symptomatique médicamenteux

Médicament	Effets Thérapeutiques	Posologie
Dérivés Nitrés : Dinitrate d'isosorbide →Ttt de choix	<ul style="list-style-type: none">- Effet vasodilatateur ++ veineux :<ul style="list-style-type: none">↳ pré et post charge du VG↳ la demande myocardique en O₂- Doublement utile en cas d'OAP sur SCA :<ul style="list-style-type: none">→ vasodilatation coronaire- Contre Indication : EDC, RM ou Rao, ttt par Viagra	<ul style="list-style-type: none">- Sublinguale action rapide2à 3 sprays à renouveler- IV boli répétés 3mg/5mn- Relais IVSE1mg/h → 6mg/h selon la PAS

Prise en charge thérapeutique :

Ttt symptomatique
médicamenteux

Médicament	Effets Thérapeutiques	Posologie
Diurétiques de l'anse Furosémide	<ul style="list-style-type: none">-Effet diurétique-Effet vasodilatateur veineux<ul style="list-style-type: none">↳ pré charge↳ la pression hydrostatique capillaire <p style="text-align: center;">→ ↳ la congestion</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dose initiale : 1mg/kg- Voie IVSE pas de bénéfice/boli- $\frac{1}{2}$ vie 6h → inutile de répéter les injections les 1ères Heures- Associer thiazidique ou spironolactone Si : Anasarque, Ice Ren CH, Réponse insuffisante au 1^{er} bolus ou ttt diurétique au long cours

Prise en charge thérapeutique :

Ttt symptomatique
médicamenteux

Médicament	Effets Thérapeutiques	Posologie
Inotropes positifs : Dobutamine	- Indications : → bas débit et signes d'hypoperfusion - Effet : ↗ contractilité myocardique	- Dose initiale : 2 à 3 μ g/kg/mn IVSE - ↗ en fct° des paramètres HD
Vaso-constricteurs Noradrénaline	- Indications : EDC cardiogénique sans amélioration ss inotropes	

Prise en charge thérapeutique :

Ttt symptomatique
médicamenteux

Médicament	Effets Thérapeutiques	Posologie
Digoxine	<ul style="list-style-type: none">- Effet inotrope lent→ limite son utilisation ds l'OAP- Contre Indication :→ Tr de la conduction, ischémie	
Lévosimendan	<ul style="list-style-type: none">- Indications:Contrecarrer l'effet d'un ttt beta bloquant	

Prise en charge thérapeutique :

OAP sur HTA

Ttt Etiologique

Médicament	Effets Thérapeutiques	Posologie
Nitroprussiate de sodium Nipride	- Indication: OAP sévère sur HTA maligne	0,2 à 2 μ g/kg/mn IVSE
Nicardipine Loxen	- Indication: OAP sur pic Hypertensif → Vasodilatateur artériel et coronaire	1 à 5 mg/h selon PAS

Prise en charge thérapeutique :

Ttt Etiologique

Etiologie	Moyens Thérapeutiques
SCA	Ttt anti-ischémique Reperfusion
Tr de rythme	Ttt anti arythmique
Valvulopathie sténosante	Tttt Chirurgical en urgence
Facteur décompensant une Ice C ch	ATB si infection Arrêt beta B...

Figure 8 Management of pulmonary oedema. MCS = mechanical circulatory support; RRT = renal replacement therapy; SBP = systolic blood pressure.

FIGURE 3. Prise en charge des patients en IC aiguë décompensée, d'après les recommandations ESC 2021.

Dg de **gravité**
Dg **étiologique**
Profil
Perf/congestion

Urgence
diagnostique

OAP
cardiogénique

PEC optimale
précoce
symptomatique +
étiologique

Bon suivi
Ttt de fond
éviter les
recidives

Merci
Pour Votre Attention