L'épuration extra-rénale en réanimation

Dr Merhabene Takoua

H.R.Zaghouan

Eric A. J. Hoste
Sean M. Bagshaw
Rinaldo Bellomo
Cynthia M. Cely

Epidemiology of acute kidney injury in critically ill patients: the multinational AKI-EPI study

- Cohorte de 1802 patients, 97 ICU
- Prévalence IRA (KDIGO): 62% (la moitié KDIGO 3)
- les étiologies les plus fréquentes: sepsis (40%) et hypovolémie (37%)
- EER (14% vs 4% en 2005)
- Mortalité en réa: 18% (all patients) vs 7% (sans IRA) vs 27% (IRA)

EER en réa → Trouver des réponses à:

- Pourquoi?
 - Indications rénales
 - Indications non rénales
- Quand? (fast or wait and see)
- Comment?
 - Modalités diffusion/convection
 - Continue/discontinue
 - Dose d'épuration
 - Anticoagulation
 - L'accès veineux

Un peu d'histoire

- Graham T 1854
 - Principe de la diffusion
- Abell JJ 1914
 - Première dialyse chez l'animal
- Kolff WJ 1944
 - Première hémodialyse efficace chez l'Homme
- Kramer P 1977
 - Première hémofiltration continue

Quand débiter la dialyse?

POUR

Équilibre électrolytique

Gestion des fluides

Prévention de la surcharge

Urémie majeure

CONTRE

Gestion des médicaments

Immobilisation/cout

Cathétérisme central

anticoagulation

Éventuels avantages de l'hémodialyse

Y-a-t-il un impact?

Indications formelles

- Hyperkaliémie réfractaire
- Acidose métabolique sévère
- Surcharge volémique
- Anurie ou oligurie extrême (< 50 ml/12 heures)
- Encéphalopathie urémique
- Péricardite urémique
- Intoxication à une substance dialysable
- Hyperthermie menaçante

IN ANY CASE: Treat and cure

Graphical Abstract

1) The cause of hyperkalemia

2) associated disorders (e.g. treatment of shock, correction of hypovolemia or heart failure, or treat the cause of AKI)

Initiation de la dialyse dans IRA

Épuration extrarénale en réanimation adulte et pédiatrique.
Recommandations formalisées d'experts française sous l'égide
de la Société de réanimation de langue française (SRLF),
avec la participation de la Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar),
du Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP)
et de la Société francophone de dialyse (SFD)

2014

Campagne « Surviving Sepsis » (Survivre au sepsis) :
Guide international pour la prise en charge du sepsis
et du choc septique : 2016

Avant
2016

2016

2018

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

ORIGINAL ARTICLE

Initiation Strategies for Renal-Replacement
Therapy in the Intensive Care Unit

AKIKI

Timing of Renal-Replacement Therapy
in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis

IDEAL-
ICU

JAMA | Original Investigation | CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT

Effect of Early vs Delayed Initiation of Renal Replacement
Therapy on Mortality in Critically Ill Patients
With Acute Kidney Injury
The ELAIN Randomized Clinical Trial

ELAIN

REVIEW

Open Access

Renal replacement therapy in adult and pediatric intensive care

Recommendations by an expert panel from the French Intensive Care Society (SRLF) with the French Society of Anesthesia Intensive Care (SFAR) French Group for Pediatric Intensive Care Emergencies (GFRUP) the French Dialysis Society (SFD)

Champs 1 : Critères d'initiation de l'épuration extrarénale dans la défaillance rénale

1.1 Il faut initier sans délai l'épuration extrarénale dans les situations mettant en jeu le pronostic vital (hyperkaliémie, acidose métabolique, syndrome de lyse, œdème pulmonaire réfractaire au traitement médical). (Avis d'experts) Accord fort

1.4 Il faut considérer « précoce » l'initiation d'une épuration extrarénale, au stade KDIGO 2 ou dans les 24 heures suivant l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë dont la réversibilité semble peu probable. (Avis d'experts) Accord faible

1.5 Il faut considérer « tardive » l'initiation de l'épuration extrarénale à plus de 48 heures de la survenue d'une insuffisance rénale aiguë KDIGO 3 ou lors de l'apparition d'une situation mettant en jeu le pronostic vital et en rapport avec l'insuffisance rénale aiguë. (Avis d'experts) Accord faible

KDIGO

KDIGO definition of acute kidney injury

Stage	Creatinine Criteria	Urine Output Criteria
1	Cr 1.5-1.9 times baseline, OR Cr increase >0.3 mg/dL	< 0.5 ml/kg/hr x 6-12 hours
2	Cr 2-2.9x baseline	<0.5 ml/kg/hr for >12 hours
3	Cr > 3x baseline, OR Cr > 4 mg/dL, OR Initiation of dialysis	<0.3 ml/kg/hr for >24 hours, OR Anuria > 12 hours

Patients are staged based on the single most concerning feature.

ORIGINAL ARTICLE

Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit

rdive n'aggrave

centrique (31ICU)

que bras

diver (72h)

In a trial involving critically ill patients with severe acute kidney injury, we found no significant difference with regard to mortality between an early and a delayed strategy for the initiation of renal-replacement therapy. A delayed strategy averted the need for renal-replacement therapy in an appreciable number of patients.

Nonsurvivors	6 (2-14)	6 (2-13)	0.85
Nosocomial infection			
Catheter-related bloodstream infection			
Patients with infection — no. (%)¶	31 (10)	16 (5)	0.03
Median incidence per 1000 catheter-days (IQR)	5.4 (2.3-4.6)	2.1 (1.1-3.1)	0.09

	strategy n=311	strategy n=308	
Diuretics— no. (%)	4 (1.3)	112 (36.5)	<0.001
Medical treatment of hyperkalemia — no. (%)	17 (5.5%)	67 (22.9%)	<0.001
Medical treatment of acidosis— no. (%)	21 (6.8%)	49 (16.7%)	<0.001

Traitement médical associé

Timing of Renal Support and Outcome of Septic Shock and Acute Respiratory Distress Syndrome

AJRCCM 2018

Figure 2: Probability of survival in subgroups of patients: septic shock, ARDS, higher SAPS3 (tertile [78-138]), higher SOFA (tertile [13-20])

a-Septic Shock

—	174	132	110	100	93	88	85	84	84
—	174	135	110	105	96	88	85	83	82

b-ARDS

—	104	88	70	62	55	51	52	50	49	48
—	103	77	64	58	55	53	52	50	50	50

c-Higher SAPS III

—	311	248	202	160	145	143	141	139	138	138
—	308	240	200	160	154	148	145	142	142	141

d-Higher SOFA

—	108	78	64	58	52	48	47	44	43	43
—	87	64	54	48	45	40	39	36	35	35

Figure 3: Renal function recovery according to subgroups

—	174	64	25	15	6
—	174	43	18	11	4

—	104	30	14	11	3
—	103	22	9	5	1

Table 3: Factors independently associated with renal function recovery

	ARDS		Septic shock	
	HR [CI95%]	p-value	HR [CI95%]	p-value
Randomization to delayed RRT strategy	1.7 [1.1-2.5]	0.009	1.90 [1.41-2.58]	<0.001
Cumulative urine output D1-D2		<0.001		<0.001
[100-300[	1.0 [0.4-2.6]		1.8 [1.0-3.5]	
[300-800[	3.5 [1.6-7.6]		3.5 [1.9-6.3]	
≥ 800	9.9 [4.9-20.2]		9.8 [5.5-17.5]	
Diuretics	1.9 [1.2-3.2]	0.019		NS
SAPS 3		0.026		0.001
[68-78]	1.2 [0.8-1.9]		0.7 [0.5-1.0]	
[78-138]	0.6 [0.4-1.0]		0.5[0.3-0.7]	

Characteristic	ARDS			Septic shock		
	Early RRT strategy	Delayed RRT strategy	p	Early RRT strategy	Delayed RRT strategy	p
	N=101/104	N=56/103		N=172/174	N=95/174	
First modality- no. (%)			0.34			0.80
Intermittent RRT	54 (53)	24 (43)		86 (50)	51 (54)	
Continuous RRT	47 (46)	32 (57)		86 (50)	44 (46)	
RRT modalities during ICU stay- no. (%)			0.57			0.39
Intermittent RRT only	42 (42)	20 (36)		62 (36)	41 (43)	
Continuous RRT only	36 (36)	25 (45)		68 (38)	30 (32)	
Both modalities	22 (22)	11 (20)		42 (24)	24 (25)	
Total number of RRT sessions	579	306		1026	629	

Effect of Early vs Delayed Initiation of Renal Replacement Therapy on Mortality in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury

The ELAIN Randomized Clinical Trial

Mai 2016

Figure 2. Mortality Probability Within 90 Days After Study Enrollment for Patients Receiving Early and Delayed Initiation of Renal Replacement Therapy (RRT)

- ✓ Étude pilote monocentrique
- ✓ 231 patients Post chirurgie cardiaque
- ✓ KDIGO 2 et NGAL 150 ≥ mg/L
- ✓ Hypothèse: dialyse précoce améliore le pronostic
- ✓ 2 bras: précoce (8h) vs tardive (12h KDIGO 3)

Table 3. Clinical Outcomes for Early vs Delayed Renal Replacement Therapy (RRT) Among Critically Ill Patients

	Early (n = 112)	Delayed (n = 119)	P Value	Absolute Difference, % (95% CI)	OR or HR (95% CI)
Recovery of renal function at day 90 ^e					
Yes	60 (53.6)	46 (38.7)	.02	14.9 (2.2 to 27.6)	OR: 0.55 (0.32 to 0.93) ^f
No ^g	52 (46.4)	73 (61.3)			
Recovery of renal function at day 90 ^e					
Yes	60 (88.2)	46 (85.2)	.62	3.1 (-9.1 to 15.2)	OR: 0.77 (0.27 to 2.17) ^h
No ⁱ	8 (11.8)	8 (14.8)			
Requirement of RRT on day 90, No./total No. patients alive at day 90 (%)	9/67 (13.4) ^j	8/53 (15.1) ^k	.80	-1.7 (-14.3 to 11.0)	OR: 0.87 (0.31 to 2.44)
ICU stay, median (Q1, Q3), d	15.5 (8.0, 28.0)	16.0 (6.8, 30.0)	.95	0.0 (-3.0 to 3.0)	

Table S4: Analysis of pro- and anti-inflammatory markers

	Early, d0 (n=112)	Delayed, d0 (n=119)	Absolute difference Early - Delayed [95% CI]	p- value	Early, d1 (n=112)	Delayed, d1 (n=119)	Absolute difference Early - Delayed [95% CI]	p-value
MIF, median (Q1, Q3), pg/ml	18471.6 (8423.4, 48146.4)	16675.2 (10155.6, 38407.2)	-98.4 [-4465.2, 4647.6]	0.79	14388.0 (6393.3, 28118.7)	15346.2 (7362.9, 30125.7)	-1132.2 [-4747.2, 2564.4]	0.89
IL-6, median (Q1, Q3), pg/ml	1218.3 (435.6, 2142.0)	871.1 (217.5, 1778.4)	224.9 [30.4, 467.9]	0.41	399.4 (116.5, 901.1)	989.3 (190.9, 2012.8)	-310.9 [-663.2, - 93.3]	0.02
IL-8, median (Q1, Q3), pg/ml	344.0 (145.5, 568.1)	222.6 (71.8, 480.5)	73.0 [10.4, 143.5]	0.08	65.7 (28.0, 162.5)	215.5 (67.3, 373.7)	-105.9 [-160.6, - 52.7]	0.001

Analyse du groupe dialyse tardive

eTable S2: Sub-group analysis of the delayed group (n=119)

	Delayed (n=91)	Absolute indication [‡] (n=17)	p-value
Time from KDIGO 2 to RRT, median (Q1, Q3), hours	25.0 (19.0, 40.0)	27.0 (14.0, 41.0)	0.97
Primary endpoint			
90-day all cause mortality, No. (%)	53 (58.3)	9 (52.9)	0.91
Key secondary endpoints			
Duration of RRT, median (Q1, Q3), days ¹	36 (7, -)	12 (5, 71)	0.91
ICU stay, median (Q1, Q3), days	17.0 (9.8, 29.0)	9.0 (3.5, 39.0)	0.63
Hospital stay, median (Q1, Q3), days	43.0 (25.5, 80.3)	38.0 (4.0, 92.5)	0.55

AKIKI vs ELAIN

	AKIKI	ELAIN
Principal hypothesis	Delayed RRT reduces 60-d mortality	RRT reduces 90-d mortality by 18%
Patients enrolled	620	231
Centers	2	1
Age, y	66	66
SOFA	16	16
CKD, %	41	41
Mechanical ventilation, %	88	88
Pressor requirement, %	88	88
Septic shock, %	32	32
Surgical, %	97	97
Criteria for early RRT	Stage 3 AKI	KDIGO stage 2 AKI
Criteria for delayed RRT	Stage 3 AKI	KDIGO stage 3 AKI
Scr at RRT initiation	4.4 (2.4)	1.9 (0.6)
Scr at RRT initiation in early group (SP)	5.3 (2.3)	2.4 (1.0)
Scr at RRT initiation in delayed group	2 (1-3) ^a	6 (4-7) ^b
Time to RRT initiation	57 (25-83) ^a	25.5 (18.8-40.3) ^b
Modality	IHD, SLED, or CRRT	CVVHDF only permitted modality for first 7 d
Lost to follow-up, %	98	100
Completed arm, %	51	91

critically ill patients with AKI. However, these trials have not resolved this dilemma and practice is likely to continue to vary widely, such that currently

Timing of initiation of renal replacement therapy for acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials

mortalité

Dépendance à l'hémodialyse chronique

ORIGINAL ARTICLE

IDEAL-ICU
octobre 2018

Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis

RIFLE

	Cr/ GFR Criteria	Urine Output (UO) Criteria
Risk	Increased Cr x1.5 or GFR decreases >25%	UO <0.5 ml/kg/hr x 6 hr
Injury	Increased Cr x 2 or GFR decreases >50%	UO <0.5 ml/kg/hr x 12 hr
Failure	Increased Cr x 3 or GFR decreases >75% or Cr ≥ 4 mg/dl (with acute rise of ≥ 0.5 mg/dl)	UO <0.3 ml/kg/hr x 24 hr or anuria x 12 hr
Loss	Persistent ARF = complete loss of renal function for > 4 weeks	
ESRD	End Stage Renal Disease	

KDIGO

	Cr Criteria	Urine Output (UO) Criteria
Stage 1	Increased Cr x1.5 or ≥0.3 mg/dl	UO <0.5 ml/kg/hr x 6 hr
Stage 2	Increased Cr x 2	UO <0.5 ml/kg/hr x 12 hr
Stage 3	Increased Cr x 3 or Cr ≥ 4 mg/dl (with acute rise of ≥ 0.5 mg/dl)	UO <0.3 ml/kg/hr x 24 hr or anuria x 12 hr

- ✓ RCT multicentrique française
- ✓ 29 ICU
- ✓ 2012-2016
- ✓ Dialyse précoce (12h) vs tardive (48h)
- ✓ Critères RIFLE (FAILURE)
- ✓ 488 patients/ choc septique
- ✓ End point: mortalité à j 90
- ✓ Hypothèse: dialyse précoce améliore la balance hydrique et donc le pronostic

ORIGINAL ARTICLE

Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis

Table 2. Primary and Secondary Outcomes.*

NS

Variable	Early Strategy (N=246)	Delayed Strategy (N=242)	P Value
Median days free of vasopressors (IQR)¶	16 (0–25)	17 (0–25)	0.87
Median length of ICU stay (IQR) — days	11 (4–19)	10 (5–19)	0.91
Survivors	12 (8–21)	12 (8–21)	0.88
Nonsurvivors	5 (2–15)	6 (3–14)	0.64
Median length of hospital stay (IQR) — days	23 (10–40)	23 (10–44)	0.34
Survivors	22.0 (9.0–38.0)	21.0 (10.0–42.5)	0.53
Nonsurvivors	25 (15–53)	42 (33–56)	0.08
SOFA score without renal component			
Day 1	9.3±3.5	9.3±3.2	0.84
Day 2	8.6±3.8	8.4±3.9	0.57
Day 3	8.0±4.0	7.8±4.1	0.64
Day 7	5.9±3.8	6.3±3.9	0.30
Fluid balance — ml			
Cumulative fluid balance after day 2	3737±3925	3437±3371	0.40
Cumulative fluid balance at day 7	5570±8761	5878±7472	0.75
Receipt of diuretics from day 0 to 7			
No. of patients (%)	121 (49)	124 (51)	0.65
Median cumulative dose of furosemide from day 0 to 7 (IQR) — mg	215 (65–760)	295 (80–1160)	0.18
Dependence on renal-replacement therapy among survivors — no./total no. (%)			
Day 28	17/134 (13)	17/140 (12)	0.89
Day 90	2/101 (2)	3/110 (3)	1.00

Median time from diagnosis of failure-stage acute kidney injury to initiation of renal-replacement therapy (IQR) — hr†	7.6 (4.4–11.5)	51.5 (34.6–59.5)	<0.001
Patients who received renal-replacement therapy — no. (%)	239 (97)	149 (62)	<0.001
Patients in the delayed-strategy group who received emergency renal-replacement therapy before 48 hr, according to criterion — no. (%)‡		41 (17)	
Metabolic acidosis			
No. of patients (%)		20 (8)	
Median pH (IQR)		7.10 (7.06–7.13)	
Hyperkalemia			

Among patients with septic shock who had severe acute kidney injury, there was no significant difference in overall mortality at 90 days between patients who were assigned to an early strategy for the initiation of renal-replacement therapy and those who were assigned to a delayed strategy.

Median days free of renal-replacement therapy (IQR)¶	12 (1–25)	16 (2–28)	0.006
--	-----------	-----------	-------

Table 3. Complications and Adverse Events.

Complication or Adverse Event	Early Strategy (N=246)	Delayed Strategy (N=242)	P Value
Complications potentially related to acute kidney injury or renal-replacement therapy in the first 7 days after enrollment			
Median pH (IQR)	7.10 (7.06–7.13)	7.10 (7.06–7.13)	0.30
Hyperkalemia†			
No. of patients (%)	0	10 (4)	0.03
Median potassium level (IQR) — mmol/liter	—	7.0 (6.7–7.3)	—

Peut être individualiser un sous groupe de contrôle stricte dans le groupe EER tardive

Arbre décisionnel

Ostermann et al, NDT, 2012

En attendant STAAR-RRT

COMMENT DIALYSER?

Techniques d'EER

Épuration des solutés selon PM

Diffusion/convection

Perturbation	Mécanismes de correction par la dialyse
Accumulation de toxines urémiques	<ul style="list-style-type: none">• Par diffusion vers le dialysat
Equilibre acido-basique	<ul style="list-style-type: none">• Par diffusion vers le dialysat: élimination des acides organiques• Par diffusion depuis le dialysat: apport du tampon bicarbonate
Equilibre électrolytique	<ul style="list-style-type: none">• Par diffusion vers le dialysat: élimination de K^+ et de phosphore
Equilibre hydrosodé	<ul style="list-style-type: none">• Par convection: retrait d'eau plasmatisque (dont les concentrations en solutés (Na^+, Cl^-, K^+...) sont identiques au plasma) = ultrafiltration
Intoxications	<ul style="list-style-type: none">• Par diffusion vers le dialysat

Durée de l'EER

INTERMITTENTE OU CONTINUE

	Hémodialyse intermittente	EER continue
	Diffusion Clairance élevée des petites molécules	Convection et/ou diffusion lente Clairance réduite des petites et moyennes molécules
Durée du traitement	Courte	Longue Gène la mobilisation du patient
Stabilité hémodynamique	Peut être plus difficile	Oui
Contrôle de la surcharge	Plus compliqué	aisé
Nutrition	Plus compliquée	aisée
Charge de travail	faible	Plus importante
Coût	Relativement faible 30 DT	Plus important 1500 DT

Ce que disent les recommandations?

Champs 3.1 : Choix de la méthode

3.1.1 Les techniques d'épuration extrarénale continues et intermittentes, peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l'expérience de l'équipe. Accord fort

3.1.2 Les techniques d'épuration extrarénale diffusives ou convectives peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l'expérience de l'équipe. Accord fort

3.1.3 Chez les patients cérébrolésés à risque d'hypertension intracrânienne, il faut probablement préférer une technique d'épuration continue ou prolongée à faible clairance (SLED). (Avis d'experts) Accord fort

RFE

2012

2016

P. TRAITEMENT DE SUPPLÉANCE RÉNALE

1. Les traitements continus de suppléance rénale et l'hémodialyse intermittente sont équivalents chez les patients atteints d'un sepsis et d'une insuffisance rénale aiguë (grade 2B).
2. Utiliser des traitements continus pour faciliter la gestion de l'équilibre liquidien chez les patients septiques hémodynamiquement instables (grade 2D).

P. TRAITEMENT DE SUPPLÉANCE RÉNALE

1. Nous suggérons qu'un traitement de suppléance rénale (RRT), soit continu soit intermittent, soit utilisé chez les patients atteints de sepsis et de lésions rénales aiguës (faible recommandation, qualité modérée des preuves).
2. Nous suggérons d'utiliser des traitements continus pour faciliter la gestion de l'équilibre liquidien chez les patients septiques hémodynamiquement instables (faible recommandation, très faible qualité des preuves).
3. Nous suggérons de ne pas utiliser le RRT chez les patients atteints de sepsis et des lésions rénales aiguës pour l'augmentation de la créatinine ou l'oligurie sans autres indications définitives pour la dialyse (faible recommandation, faible qualité des preuves).

SSC

ORIGINAL

Continuous renal replacement therapy versus intermittent hemodialysis in intensive care patients: impact on mortality and renal recovery

. Conversely, the use of CRRT as initial modality in patients without hemodynamic instability was associated with a higher mortality (HR 2.24, 95 % CI 1.24–4.04; $p = 0.01$)

CRRT est meilleur si gain de poids ≥ 2kg

Renal Replacement Therapy Modality in the ICU and Renal Recovery at Hospital Discharge*

Critical Care Medicine 2018

Martin Bonnassieux, MD^{1,2}; Antoine Duclos, MD, PhD³; Antoine G. Schneider, MD, PhD⁴;
 Aurélie Schmidt, MS⁵; Stève Bénard, PharmD⁵; Charlotte Cancalon, MS⁵; Olivier Joannes-Boyau, MD⁶;
 Carole Ichai, MD, PhD^{7,8}; Jean-Michel Constantin, MD, PhD⁹; Jean-Yves Lefrant, MD, PhD¹⁰;
 John A. Kellum, MD, FACP, MCCM¹¹; Thomas Rimmelé, MD, PhD^{1,2}; for the AzuRéa Group

- étude rétrospective multicentrique française (291)
- Tous les patients ayant eu une IRA avec EER
- 58,635 / 25,750 patients survivants à la sortie de réa
- Évaluation des modalités de dialyse (intermittente vs continue)
- Mortalité

Conclusions: In this large retrospective study, intermittent hemodialysis as an initial modality was associated with lower renal recovery at hospital discharge among patients with acute kidney injury, although the difference seems somewhat clinically limited.

Variables	Hazard Ratio (95% CI)	p
Main analysis (n = 25,750)	0.910 (0.834–0.992)	0.0327
Propensity score (n = 16,816)	0.883 (0.798–0.975)	0.0144
Only one modality (n = 21,204)	0.893 (0.814–0.986)	0.0244
Mortality as a competitive risk (n = 32,826)	0.958 (0.919–0.997)	0.0375

La dose dialyse

--> **EER continue** (Hémofiltration)

✓ **débit effluent** ou **débit de réinjection**
dose exprimée en **ml/kg/heure**

--> **Hémodialyse intermittente:**

✓ **Durée séance**

✓ **Fréquence:** nombre de séances / semaine

Taux de réduction de l'urée par séance (**TRU %**)
ou **Kt/V urée** (par séance ou cumulée/semaine)

Dose de dialyse optimale

ATN
2008

RENAL
2009

Après 2008 : époque raisonnable

Avant 2008: époque inflationniste
faire plus pour sauver plus

Intensity of Renal Support in Critically Ill Patients with Acute Kidney Injury

The VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network*

- Étude multicentrique (27 centres)
- Deux stratégies de prise en charge randomisées
 - EER intense : HDI 6 / semaine ou CVVHDF (35 mL/kg/h)
 - EER moins intense : HDI 3 / semaine ou CVVHDF (20 mL/kg/h)
- 1124 patients

Table 3. Primary and Secondary Outcomes.*

Outcome	Intensive Strategy (N=563)	Less-Intensive Strategy (N=561)	Odds Ratio or Mean Difference (95% CI)†	P Value
Death from any cause by day 60 — no. (%)	302 (53.6)	289 (51.5)	1.09 (0.86 to 1.40)	0.47
In-hospital death — no. (%)	288 (51.2)	269 (48.0)	1.15 (0.90 to 1.47)	0.27
Discharged to home, off dialysis, by day 60 — no./no. with data (%)	88/560 (15.7)	92/561 (16.4)	0.95 (0.68 to 1.32)	0.75
Recovery of kidney function by day 28 — no./no. with data (%)‡			0.03 (0.02 to 0.07)	0.24

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

OCTOBER 22, 2009

VOL. 361 NO. 17

Intensity of Continuous Renal-Replacement Therapy in Critically Ill Patients

RENAL

The RENAL Replacement Therapy Study Investigators*

- Étude multicentrique (35 ICU)
- Australie/ new Zélande
- 1500 patients
- 2 stratégie en CRRT: 25 ou 40ml/kg/h

Outcome	Higher-Intensity CRRT	Lower-Intensity CRRT	Odds Ratio	P Value†
Death — no./total no. (%)				
By day 90	322/721 (44.7)	332/743 (44.7)	1.00 (0.81–1.23)	0.99
By day 28	278/722 (38.5)	274/743 (36.9)	1.07 (0.87–1.32)	0.52
Place of death — no./total no. (%)				
ICU	251/722 (34.8)	254/743 (34.2)	1.026 (0.827–1.273)	0.81
Hospital ward	68/722 (9.4)	76/743 (10.2)	0.913 (0.647–1.288)	0.60
Outside hospital, after discharge	3/722 (0.4)	2/743 (0.3)	1.546 (0.258–9.279)	0.63
RRT dependence among survivors				
At day 28	64/443 (14.4)	57/469 (12.2)	1.22 (0.83–1.79)	0.31
At day 90	27/399 (6.8)	18/411 (4.4)	1.59 (0.86–2.92)	0.14

BMJ Open High-dose versus low-dose haemofiltration for the treatment of critically ill patients with acute kidney injury: an updated systematic review and meta-analysis

2017

8 études; 2970 patients

Durée de séjour

(D) Length of ICU stay

Mortalité en réa

(B) ICU mortality

	Number of studies included	Pooled OR	Lower limit	Upper limit	Z value	p Value
Delivered dose						
(A) 90-day mortality						
50 mL/kg/h	2	0.97	0.66	1.43	-0.16	0.88
40 mL/kg/h	1	1.24	0.63	2.43	0.63	0.53
30 mL/kg/h*	1	1.00	0.81	1.23	-0.03	0.97
(B) ICU mortality						
50 mL/kg/h	1	1.20	0.58	2.47	0.50	0.62
40 mL/kg/h	2	1.39	0.96	2.00	1.75	0.08
30 mL/kg/h	2	1.16	0.84	1.62	0.90	0.37
(C) Hospital mortality						
50 mL/kg/h	1	0.99	0.61	1.61	-0.03	0.98
40 mL/kg/h	1	1.39	0.71	2.74	0.96	0.34
30 mL/kg/h	1	0.91	0.65	1.29	-0.52	0.60

REVIEW

Open Access

Renal replacement therapy in adult and pediatric intensive care

3.3.1 **In intermittent RRT** the minimum delivered dose of dialysis should probably be (1) three sessions per week of at least 4 h with a blood flow >200 mL/min and a dialysate flow >500 mL/min, or (2) a Kt/V index >3.9 per week, or (3) maintenance of a predialysis urea concentration of 20–25 mmol/L. Strong agreement

3.3.3 The delivered dose of dialysis should be adapted to the patient's needs in terms of control of metabolism, electrolyte balance and acid–base equilibrium. The onset of hypokalemia and/or hypophosphatemia must be prevented. The dosage of drugs removed by RRT should be adapted to the dose delivered. (Expert opinion) Strong agreement

3.3.2 **In continuous RRT**, the minimum delivered dose of dialysis should probably be 20–25 mL/kg/h of effluent, by filtration and/or diffusion. Strong agreement

3.4.6 In sustained low-efficiency dialysis, low blood and dialysate flow rates should be used. (Expert opinion) Strong agreement

Dose de dialyse recommandée

Quelle voie d'accès choisir?

Tableau 1 : Site d'insertion préférentiel d'un cathéter de dialyse

Ordre de choix	Site d'insertion	Longueur du cathéter
1	Veine jugulaire interne droite	15 cm
2	Veines fémorales droite et gauche	25 cm
3	Veine jugulaire interne gauche	20 cm
4	Veine sous-clavière côté dominant	Si droite : 15 cm
5	Veine sous-clavière côté non dominant	Si gauche : 20 cm

- Diamètre externe (12-16 Fr soit 4-5.3 mm)
- Extrémité: canon de fusil
- Distance orifice proximal-distal: 2-3 cm (recirculation)
- Déconseiller l'inversion des voies (embolie gazeuse)
- Mise en place écho-guidée

Comment prévenir la coagulation du circuit?

L'anticoagulation en CRRT

❑ Anticoagulation régionale au citrate est fortement recommandée (recommandations d'experts)

❑ Une augmentation de la demi-vie des hémofiltres

❑ Une optimisation de la dose d'épuration

❑ Une meilleure stabilité des MDCS administrés

❑ Une diminution des complications hémorragiques

❑ Qq complications métaboliques (surdosage en citrate)

❑ CI: situations de dysfonction mitochondriales (IHC)

❑ mais apport continu de calcium (++)KVC),

❑ contrôle strict du calcium ionisé en post filtre ($\approx 0,3$ mmol/l) et en plasmatique (≈ 1 mmol/l)

❑ **Expertise de l'équipe**

Dialyse= travail d'équipe apprentissage/compétences techniques

on sécurisé | www.reannecy.org/PAGES/espace%20medical/nephro/intro%20eer.html

REANNECY.ORG

accueil espace médical espace paramédical espace déchocage

épuration extra-rénale

L'EER, modalité de substitution de l'insuffisance rénale vise à corriger et maintenir l'équilibre acido basique, ionique et volémique ; à éliminer les déchets toxiques ; à assurer le support nutritionnel, tout en préservant la récupération rénale lors d'une Insuffisance Rénale Aiguë.

Régulièrement appliquée dans le service, nous en réalisons environ 250 séances / an. Nos pratiques diffèrent de nombre de services de réanimation en raison de l'utilisation préférentielle d'une machine -Fresenius 5008- conçue pour la [réinjection On Line](#) dans l'EER de l'Insuffisance Rénale Chronique et alimentée en [eau osmosée ultra pure](#) disponible dans toutes les chambres du service.

Ce choix technologique repose sur la possibilité de réaliser tous les modes d'EER avec une seule machine, de sécuriser au maximum l'EER, de diminuer la charge de travail infirmier et de nettement diminuer les coûts de traitement.

Afin de sécuriser l'ensemble du dispositif –anticoagulation régionale au citrate et panne d'eau osmosée- un appareil d'hémodiafiltration de réanimation Fresenius MultiFiltrate est aussi disponible. Il sert de plus à réaliser les échanges plasmatiques.

Initier l'EER peut se faire dans différentes situations, impossibles à détailler ici, mais les principales indications sont, dans le contexte de l'IRA :

- en urgence une hyperkaliémie réfractaire au traitement médical,
- une acidose métabolique non contrôlée,
- une hyperhydratation compliquée d'œdème pulmonaire et/ou cérébral et

fichiers associés

- ☐ l'épuration extra-rénale en réanimation: théorie et pratique
- ☐ EER en réanimation: continue ou séquentielle ?
- ☐ hémodiafiltration online en réanimation
- ☐ hémodiafiltration à haut volume
- ☐ anticoagulation au citrate pour les techniques d'EER en réanimation
- ☐ anticoagulation au citrate sur multifiltrate
- ☐ modèle de prescription 5008
- ☐ modèle de prescription multifiltrate
- ☐ abords vasculaires
- ☐ choix de machine d'hémodiafiltration en réanimation (SRLF 2009)
- ☐ l'eau de dialyse en

Méd. Intensive Réa (2017) 26:277-284
DOI 10.1007/s13546-017-1286-8

ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

Amélioration des pratiques paramédicales : élaboration d'un livret d'aide à l'épuration extrarénale en réanimation. Expérience d'un centre hospitalier général*

Improved Paramedical Practices: Development of a Handbook for Renal Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. Experience in a General Hospital

C. Poupinet · C. Biedermann · M. Ventôse · C. Bornstain · F. Vincent

Reçu le 8 février 2017 ; accepté le 23 mai 2017
© SRLF et Lavoisier SAS 2017

HDI intermittente : Fiche de surveillance

Nom/Prénom.....**DM**.....

Indication :.....

Prescription (démarrage): Date/heure.....

Vitesse de pompe :.....ml/mn ; [Na+] dialysat :.....mmol/l

Température dialysat :..... ; UF ml/H :.....ml/H

Durée séance prévue :.....Heures ; dialysat.....ml/mn

Anticoagulation : rinçage..... ; démarrage.....

Position Cathéter..... Date de pose.....

Heure	Débit	[Na+]	Temp	UF	PV	PTM	TA	FC	ELJ	Type/dose catécholamines

Incidents/Intervention :

Heure	Incident	Intervention	Heure	Incident	Intervention

Durée effective de la séance..... **UF totale** :.....ml

Efficacité de la séance :

Avant Après (délais bilan)..... taux réduction Urée.....

Urée..... Urée.....

Créat..... Créat.....

Ionog..... Ionog.....

Procédures écrites
fiches de surveillance
standardisée

Fiche de surveillance : Epuration extra-rénale continue

Nom :	KT posé le :	Vitesse de pompe :	CVVH <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
Prénom :	Rein changé le :	Dialysât :	CVV HDF <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
DM :	Anticoagulant :	Ultra-filtrat :	SCUF <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
Date :	poids :	Pertes :	

Heure	Prescription						Malade							
	Débit Sang	PPS	Pertes	Pré/post dilution	Dialysât	Réinjection	PV	PA	PTM	Réinject°	Dialysât	Pertes cumulée	PA S/D/M	Dose catéchol
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
Bilan														

La récupération rénale

Meilleurs critères d'arrêt de dialyse seraient

- reprise diurèse ≥ 1 l sans diurétique,
- stabilisation de la fonction rénale
- Clairance rénale urinaire créat /urée

Pronostic à long terme si passage en IRC

- Augmentation de la morbi-mortalité
- Surcoût de santé
- Diminution de la qualité de vie

EER des toxiques

t (<http://www.extrip-workgroup.org>).

← → ↻ Non sécurisé | www.extrip-workgroup.org

Blood Purification in Toxicology: Reviewing the Evidence and Providing Recommendations

HOME PUBLICATIONS RECOMMENDATIONS NEWS & EVENTS PARTICIPANTS REPRESENTED SOCIETIES CONTACT US

BACKGROUND

The use of extracorporeal purification specifically for drug poisoning has existed in the clinical practice for over 70 years. Unfortunately, the evidence remains limited to reviews, opinions, commentaries, and case reports which are susceptible to biases and confounders. Randomized trials and comprehensive systematic reviews are inexistent. Furthermore, the toxicokinetic measurements and calculations in published reports are often imprecise, incomplete or incorrect; this limits the interpretation of the effect of extracorporeal treatments (ECTRs).

Despite the increasing use of ECTRs (including hemodialysis, hemofiltration, hemoperfusion, peritoneal dialysis, therapeutic plasma exchange, and exchange transfusion) in poisoning, clinicians remain uncertain of their precise role in poisoning, because of the following points:

- Despite the improvement in understanding drug pharmacokinetics, recurrent errors are still perpetuated in evaluating dialyzability of some poisons.
- The development of new antidotes and perfection of supportive care have forced the re-evaluation of ECTRs in certain poisonings.
- New ECTRs are being invented while others are hybridized or falling out of use. ECTR technology is constantly evolving, making past conclusions sometimes inapplicable today. Physicians are not always knowledgeable on the intricacies of all available ECTRs and which are best suited for a specific poisoning.
- Dialyzability and clinical improvement do not always correlate.

Tweets by @ExtripWorkgroup

Replying to @ExtripWorkgroup

5) I refer you to this excellent commentary, written by EXTRIP colleagues, that discuss these issues @DavidJuurink and @1darren1Dmr : ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24483200

Oct 3, 2018

Replying to @ExtripWorkgroup

4) Several studies now incorporate serum metformin when evaluating MALA. One can argue that if below 2mg/L, metformin has at best a minor effect on the development of MALA. But because metformin measurement isn't widely available, it is difficult to truly

KDIGO Clinical Practice Guidelines for Acute Kidney Injury

Table 3. Key recommendations for dialysis interventions for treatment of AKI

Recommendation	Evidence level
<i>Anticoagulation</i>	
Use anticoagulation in RRT as long as no impaired coagulation/bleeding risk	1B
Unfractionated or low-molecular-weight heparin for intermittent RRT	1C
Regional citrate preferred for CRRT	2B
Unfractionated or low-molecular-weight heparin in CRRT in those with contraindication to citrate; no role for prostacyclins	2C
Regional citrate in CRRT for those with at increased bleeding risk – avoid regional heparinisation	2C
Stop all heparin and use direct thrombin inhibitors (argatroban) or factor Xa inhibitors (danaparoid or fondaparinux) in heparin-induced thrombocytopenia – argatroban preferred if severe liver failure	1A
<i>Access</i>	
Choice of vein as follows:	ungraded
(1) Right Jugular	
(2) Femoral	
(3) Left jugular	
(4) Subclavian – dominant side	
Ultrasound-guided insertion	1A
No use for topical antibiotics or antibiotic locks	2C
<i>Modality</i>	
CRRT preferred to intermittent haemodialysis for those with:	2B
(1) Cardiovascular instability	
(2) Acute brain injury or cerebral oedema or raised intracranial pressure	
<i>Buffer</i>	
Use of bicarbonate rather than lactate as a buffer in those with associated circulatory shock/liver failure/lactic acidosis	1B–2B
<i>Dose</i>	
Kt/V of 3.9 per week for those on intermittent or extended RRT	1A
Effluent volume of 20–25 ml/kg/h for CRRT	1A

conclusion

- La meilleure épuration est celle qui est adaptée au malade et la mieux maîtrisée par l'équipe
- Timing: pas trop tôt ni trop tard
- Objectif en EER: 20-25 ml/kg/h en EER continue et 3,9 Kt/v en HDI
- Anticoagulation: expertise de l'équipe
- Techniques hybrides : bon compromis

Mieux vaut prévenir que guérir

Aknowledgment