évaluation de la CR-M chez les patients COVID + suspect d'une urinfection

SHERIF ISKANDER
MEZGHANI SAMYA
MED HSAN GADDOUR

Décembre
2021

BIO FIRE

POLYCLINIQUE
ERRACHID

Plan

1

Introduction

2

Sélection des données

3

Analyse des prélèvements

4

Performances microbiologiques

5

Antibiothérapie après la PCR-M

6

Conclusion

Introduction

Une antibiothérapie adaptée et précoce réduit la mortalité des pneumonies sévères.

L'émergence des résistances bactériennes dans notre pays est un fait réel et inquiétant nécessite l'utilisation d'ATB d'une manière précoce mais surtout adaptée.

Fréquence des ECBU +

Sur 1032 ECBU, **250** sont **positifs** (24,2%)

■ Positifs en milieu hospitalier

■ Positifs en communautaire

Fréquence des mécanismes de résistance détectés

Milieu hospitalier

Patients Communautaire

Fréquence des prélèvements respiratoires

Sur **552** prélèvements respiratoire, **236** sont positifs

Fréquence des mécanismes de résistance détectés

Milieu hospitalier

Patients Communautaire

Répartition des résistances acquises par germe

Germe	Phénotype	Nombre	Pourcentage
<i>K. pneumoniae</i>	sauvage	29	40,7%
	BLSE	13	32,2%
	Carbapénemase	24	22%
	Céphalosporinase	3	1,7%
	Autres	1	3,4%
Total		70	

Germe	Phénotype	Nombre	Pourcentage
<i>P. aeruginosa</i>	sauvage	16	25,8 %
	Carbapénemase	46	74,2 %
Total		62	

Germe	Phénotype	Nombre	Pourcentage
<i>P. aeruginosa</i>	sauvage	39	70,9 %
	Carbapénemase	16	29,1 %
Total		55	

Analyse de l'antibiothérapie par rapport au germes les plus fréquemment retrouvés en nosocomial (travail PROFESSEUR HAMMAMI 2019)

	Tienam	Fortum	Tazocilline	Amiklin	Ciflox	Targoc
cyanique	30	27	30	20	28	-
sielle	23	50	50	21	49	-
erobacter	19	30	27	17	16	-
etobacter	85	93	92	87	87	-
atia	0	14	7		0	-
phylocoque TIR 23%	-	-	-	-	-	1%

PCR-M

L'approche syndromique BIOFIRE® est un test moléculaire rapide de PCR mutliplex, détectant un groupe de pathogènes (virus, bactéries, parasites et gènes de résistance aux antimicrobiens) impliqué dans un même syndrome, optimisant ainsi les chances d'obtenir la bonne réponse dans un délai pertinent sur le plan clinique.

Les Panels BIOFIRE®

NEW

Respiratory Panels

23

Targets

• 13 bacteria
• 9 viruses

NEW

Blood Culture Identification Panel

43

Targets

- 26 bacteria
- 7 yeast
- 10 antibiotic-resistance genes

Gastrointestinal Panel

22

Targets

- 13 bacteria
- 5 viruses
- 4 parasites

Meningitis/Encephalitis Panel

14

Targets

- 6 bacteria
- 7 viruses
- 1 yeast

Pneumonia Panel

34

Targets

- 15 bacteria semi-quantitative
- 3 atypical bacteria
- 8 viruses + MERS-CoV
- 7 antibiotic-resistance genes

Pré requis pour bien comprendre les résultats (1)

- 1- absence dans le panel de certains microorganismes qui sont significativement bien retrouvés dans les surinfections du patient covid 19: a savoir **stentrophomonas** et l'**aspergillus** mais aussi le citrobacter et staphylocoque hominis **source de faux négatif**
- 2- la présence dans le panel de virus et de germe intracellulaire qui sont indétectable par la méthode de culture conventionnelle **source de faux positif**
- 3- PCR M une méthode quantitative qui nous fournit une concentration des germes de 10^4 jusqu'à 10^7 en sachant que plus la concentration est faible plus les chances de retrouver le germe dans les cultures est minime **source de faux +**
- 4- les faibles concentrations faibles 10^4 ou 10^5 peuvent en rapport avec une pneumopathie débutante ou décapité par une antibiothérapie

Pré requis pour bien comprendre les résultats(2)

5- dans un même prélèvement on peut trouver plusieurs germes avec plusieurs mécanisme de résistance l'interprétation des résultats dans ce cas peut être difficile mais les conséquences thérapeutiques sont en général peu modifiées

6- pour les germes BLSE environ 10 % des mécanismes de résistances ne sont pas détectés

7- pour l'acinetobacter le carbapénémase n'est pas détecté

8- les céphalosporines ne sont pas détectés

Facteur de risque BMR-BHR

- 1. Antibiothérapie dans le 90 jours précédant l'admission à l'hôpital**
- 2. Hospitalisation plus que 2 jours sur les 90 jours précédant l'infection**
- 3. Prévalence élevé de BMR dans le secteur d'hospitalisation**
- 4. Immunodépression**
- 5. Patient séjournant en long séjour en maison de retraite médicalisé (fréquence de patient hospitalisé à domicile dans notre pays)**
- 6. Traitement intraveineux en particulier antibiothérapie et chimiothérapie**
- 7. Pansement d'une plaie chronique dans les 30 jours qui précèdent l'infection**
- 8. Hémodialyse chronique**

Sélections des données

étude rétrospective

sur des patients COVID-19 hospitalisés en USI et re
entre le 26 octobre 2020 et le 01 novembre 2021

Analyse de 130 épisodes de sepsis
probable provenant de 82 patients COVID-19
avec surinfection probable

Sexe des patients

Surinfection

Chaque surinfection a été suspecté selon **un** ou **plusieurs** éléments :

- Aggravation de l'état respiratoire ($\pm$ echo cardio-pul)
- Pic fébrile
- Expectorations ou aspirations purulentes
- Etat de choc
- Bilan inflammatoire perturbé (CRP-PCT)
- Signe de surinfection au TDM thoracique +++++

Fréquence de chaque élément

35%

Aggravation de l'état
respiratoire

21%

Avec Pic fébrile

37%

expectoration ou
aspiration purulente

52%

Avec état de choc

67%

Avec bilan
inflammatoire perturbé

Signe de surinfection au TDM thoracique

Résumé

éléments	Oui
Aggravation de l'état respiratoire	35%
Pic fébrile	21%
Expectoration ou aspiration purulentes	37%
Etat de choc	52%
Perturbation du bilan inflammatoire	67%
Surinfection au TDM thoracique	56%

Évolution après surinfection

■ communautaire

■ nosocomiale

Types de l'épisode septique

Parmi les 130 épisodes de sepsis :

- 51 sont communautaires
- 79 sont nosocomiaux

Analyse des prélèvements

Résultats des prélèvements

Sur 130 épisodes de sepsis :

- 88 prélèvements sont **positifs** (un ou plusieurs micro-organismes ont été détectés)
- 42 prélèvements sont **négatifs** (aucun micro-organismes détectés)

[VALEUR]
(42)

Négatif

Positif

[VALEUR]
(88)

Résultats des prélèvements positifs

Bactéries / virus / bactéries atypiques détectés	Nombre de fois
<i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE GROUP</i>	49
<i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i>	21
<i>ENTEROBACTER CLOACAE COMPLEX</i>	19
<i>ACINETOBACTER CALCOACETICUS-BAUMANNII COMPLEX</i>	16
<i>SERRATIA MARCESCENS</i>	12
<i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>	10
<i>KLEBSIELLA AEROGENES</i>	9
<i>HEAMOPHILUS INFLUENZAE</i>	8
<i>STREPTOCOCCUS AGALACTIAE</i>	6
<i>ESCHERICHIA COLI</i>	6
<i>KLEBSIELLA OXYTOCA</i>	4
<i>PROTEUS SPP</i>	4
<i>légionnelle pneumophila</i>	2
<i>Para influenza virus</i>	2
<i>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE</i>	2
<i>Human Rhinovirus</i>	2
<i>Entérovirus</i>	2
Total d'organismes détectés	174

Communautaire Vs nosocomiale

Pourcentage des germes / communautaire

29 prlvt + / 56 germes

Pourcentage des germes / Nosocomiale

59 prlvt + / 118 germes

Performances microbiologiques

Concordance des résultats

	PCR-M	Culture conventionnelle
Concordance	+	+
	-	-
Faux positif	+	-
Faux négatif	-	+
Non exploitable	Poly-microbienne	/
Culture non faite	+	NF

Concordance des résultats

Bactéries non détectés (Faux-)

Les bactéries non détectées par la PCR-M sont impliquées dans 7 épisodes de sepsis

→ En raison de 4 espèces bactériennes et un champignon qui **ne sont pas inclus** dans le Panel

Types de bactéries	Nombre de faux -
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	2
<i>Aspergillus flavus</i>	2
<i>Citrobacter koseri</i>	1
<i>Staphylococcus hominis</i>	1
<i>Enterococcus faecium</i>	1

PCR-M+ / CC - (faux+)
34 prélèvements / 61 micro-organismes

Tableau numération

Numération	10^4	10^5	10^6	10^7
Nombre de fois	59%	25%	7%	9%

Performances microbiologiques sur PTD

- parmi les 130, 55 ont été des prélèvements trachéaux distaux provenant de 22 patients intubés
- Rapport $\frac{PaO_2}{FiO_2}$ moyen **<150** (chez des patients intubés)

Performances microbiologiques sur PTD

Comparaison taux de concordance entre PCR-M et culture conventionnelle

Spécificité et sensibilité

Nous avons **écarté**, les prélèvements suivants :

1. la CC non faite
2. PCR-M + a détecté un micro-organisme qui ne peut pas être détecté par la CC
3. CC a isolé un germe non inclus dans le panel du PCR-M

→ **Total des prélèvements comparés (76)**

Taux de sensibilité globale	93%
Taux de spécificité globale	92%

Spécificité et sensibilité

	vrai + (PCR-M = CC)	faux + (PCR-M + / CC-)	faux négative(CC +/PCR-M -)	se	sp
<i>ACINETOBACTER BAUMANNII</i>	4	7	0	100%	90%
<i>ENTEROBACTER CLOACAE</i>	2	10	0	100%	86%
<i>ESCHERICHIA COLI</i>	3	0	1	75%	100%
<i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i>	1	3	0	100%	96%
<i>KLEBSIELLA AEROGENES</i>	1	3	1	50%	96%
<i>KLEBSIELLA OXYTOCA</i>	0	1	0	--	99%
<i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE GROUP</i>	10	23	0	100%	65%
<i>PROTEUS SPP</i>	0	3	0	--	96%
<i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i>	5	9	0	100%	87%
<i>SERRATIA MARCESCENS</i>	1	7	0	100%	91%
<i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>	1	5	0	100%	93%
<i>STREPTOCOCCUS AGALACTIAE</i>	0	3	0	--	96%
<i>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE</i>	1	0	0	100%	100%

Gène de résistance

- Sur **88** prélèvements **positifs**:
- **36** prélèvements ont isolé des germes résistants (au total **71 gènes** de résistance ont été détectés)
- **52** prélèvements ont isolé des germes sauvages.

Pourcentage des gènes de résistance détectés / nbre de prlv +

Pourcentage des gènes de résistance détectés/ nombre de gène détectés

Gènes de résistance non détectés

- Concernant la résistance aux antibiotiques la PCR-M n'a pas détecté 10 fois des résistances qui ont été détectés dans la culture conventionnelle.

	Germe	Mécanisme de résistance	Nbre
Gène de résistance non inclus dans le panel	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	BLSE	2
	<i>Acinetobacter baumannii</i>	Carbapénèmase	3
	<i>Enterobacter cloacae</i>	Céphalosporinase	2
	<i>Klebsiella aerogenes</i>	Céphalosporinase	1
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	MLSB-constitutif	1
Germe non inclus dans le panel	<i>Staphylococcus hominis</i>	Méti-R	1

(TEM-SHV)

Analyse de résistance pour les épisodes de sepsis communautaires

► Parmi les 51 prélèvements analysés au cours des premiers 48 heures d'hospitalisation, 12 (24%) ont isolé des germes avec des résistances.

Germes détectés	Gènes de résistance détectés
<i>ESCHERICHIA COLI</i>	OXA-48 LIKE
<i>ESCHERICHIA COLI</i>	CTX-M
<i>ENTEROBACTER CLOACAE COMPLEX</i>	NDM(++++) OXA-48-like
2 <i>ENTEROBACTER CLOACAE COMPLEX</i>	CTX-M
<i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE GROUP</i>	KPC
2 <i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE</i>	CTX-M
<i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE</i>	CTX-M NDM (++++)
<i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE GROUP</i>	OXA-48 LIKE
1. <i>ENTEROBACTER CLOACAE COMPLEX</i> 2. <i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE GROUP</i> ,	CTX-M
1. <i>ENTEROBACTER CLOACAE</i> 2. <i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE GROUP</i>	CTX-M OXA-48-LIKE

Antibiothérapie après le résultat du PCR-M

Délai de
récupération des
résultats après le
prélèvement est au
moyen **2 Heures**

Orientation de l'antibiothérapie

- **Initiation d'ATB** : prescription d'antibiotique(s) adapté(s) .
- **Même conduite**: même démarche thérapeutique.
- **Escalade**: passage à une antibiothérapie à spectre plus large.
- **Désescalade**: passage à une antibiothérapie à spectre plus étroit.
- **Arrêt**: arrêt de l'antibiothérapie.

Orientation de l'antibiothérapie

Conclusion

- Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que l'utilisation d'un système PCR-M avec des **bonnes performances microbiologiques** peut conduire à une **adaptation précoce** de la thérapie antimicrobienne et ainsi limiter la pression de sélection
- L'interprétation des résultats du test nécessite une expertise microbiologique, une excellente connaissance du test et une **discussion** approfondie entre **microbiologistes et cliniciens**
- Ces résultats pourraient éclairer le développement d'algorithmes de décision fondés sur des preuves pour **guider la prescription** et l'adaptation d'antibiotiques à la suite des résultats de la PCR-M dans les futurs essais cliniques

Merci