INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS : RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUX SERVICES DE RÉANIMATION

Atef MTIR, Radhia ARFAOUI, Amira BEN JAZIA, Hassen BEN GHEZALA, Nozha BRAHMI
SERVICE DE RÉANIMATION DU CAMU, TUNIS

DEFINITIONS- CONCEPTS

- **Infection nosocomiale**

- infection hospitalière
- infections croisées

- **Infection associée aux soins**

- infection associée à l'environnement de soins
- infection associée à un acte de soins

- **Infection endogène / exogène**

- **Infection évitable** (application des mesures d'hygiène)

DEFINITION

- **Un délai d'au moins 48 heures** est couramment accepté pour définir une IAS
- **Pour les infections du site opératoire:** un délai de **30 jours** suivant l'intervention
- S'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique: **l'année** qui suit l'intervention

DEFINITION

- **Sortent du cadre nosologique:**
  - Les colonisations asymptomatiques
  - les infections présentes ou en incubation lors du contact avec le système de santé

EPIDEMIOLOGIE

- En France,
Fréquence: **600 000 à 1 million/ an, avec 10 000 décès/an**
- En Tunisie: Enquête (NosoTun 05)
Prévalence: **30,7%**
- Les ILS sont responsables de **millions de journées d'hospitalisation supplémentaires;**
  - x 2 la charge en soins infirmiers,
  - x 3 la dépense en médicaments,
  - x 7 les examens complémentaires

ASPECTS CLINIQUES ET SPÉCIFICITÉS

- **ORDRE DE FREQUENCE :**
  - Les PAVM
  - Les Infections urinaires
  - Les Infections sur KT
  - Les Infections du site opératoire
  - Les Bactériémies/septicémies

- **Fréquence variable selon les services**

PNEUMOPATHIES ACQUISES SOUS VENTILATION MÉCANIQUE

THE PATHOGENESIS OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA

THE PATHOGENESIS OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA

PHYSIOPATHOLOGIE** 2

Micro-inhalation

SITUATIONS FAVORISANTES DES PAVM

- 1- Comorbidités
- 2- Dénutrition
- 3- Non respect des règles d'hygiène
- 4- L'administration préalable d'antibiotiques
- 5- L'utilisation de protecteurs gastriques,
- 6- L'usage de morphiniques ou de curares (stase gastrique)
- 7- Présence de la sonde d'intubation ++++

- ✓ Abolition du réflexe de la toux
  - ✓ Compromet l'activité des cellules micellaires
  - ✓ Lésions de l'épithélium trachéal → adhésion bactérienne
-
- ✓ Réalise un véritable enduit qui permet le passage des germes des VAS aux VAI

CONTAMINATION DIRECTE PAR LE MATÉRIEL DE VENTILATION

- Pièges à eau,
- Nébuliseurs,
- Circuits de ventilation.

LES BACTERIES

Signal d'alarme

Entérobactéries BLSE, carbapénémases
A. baumannii
P. aéruginosa

Rôle du personnel soignant: la prévention

Je me lave les mains avec du produit

Comment ?

Je mets du produit sur mes mains

Je frotte mes mains à l'intérieur

Je frotte le dessus de mes mains

Je frotte entre mes doigts

Je frotte mes mains pendant 15 secondes jusqu'à ce qu'elles ne soient plus mouillées par le produit

Si j'ai les mains sèches je mets de la crème

comprendreleautisme.com avec les dessins de eContactis Santé

Je me lave les mains au savon

Comment ?

J'ouvre le robinet et mets de l'eau sur mes mains

Je mets du savon sur mes mains

Je frotte mes mains à l'intérieur

Je frotte le dessus de mes mains

Je frotte entre mes doigts

J'enlève le savon de mes mains

J'essuie mes mains avec une serviette

Je ferme le robinet

Je me lave les mains trente secondes. Je peux chanter une petite chanson pour compter le temps

comprendreleautisme.com avec les dessins de eContactis Santé

Rôle du personnel soignant: la prévention

Intubation oro-trachéale

Position décline à 30°

Inclinaison de la tête de lit entre 30° et 45°

A photograph of a hospital bed with the head tilted upwards. A control panel with several buttons is visible on the side of the bed.

Pression de ballonnet à 25-30 cm d'H₂O

Pression correcte du ballonnet

- Pression de 25 et 30 cm H₂O
- Pas de recommandations sur le rythme de la surveillance

A photograph of a blue manometer used for measuring cuff pressure. The needle is positioned between the 25 and 30 cm H₂O marks.

Aspirations sous-glottiques ...

LES INFECTIONS URINAIRES ASSOCIÉES AUX SOINS

EPIDEMIOLOGIE

- **40% des IAS**
- Essentiellement **liées** aux **sondages vésicales**
- Le plus souvent **bénignes**: mortalité **0.1%**
- Prolongent **la durée de séjour de 2,4 jours** en moyenne
- Réservoir de bactéries multi-résistantes

FACTEURS DE RISQUE D'UNE IUAS

- **Facteurs extrinsèques**
  - **Sondage urinaire** : durée, type de drainage
  - **Les instrumentations** : endoscopie +++
- **Facteurs intrinsèques**
  - Sexe (risque x 2 chez la femme)
  - Âge (95% des IUN surviennent après 50 ans)
  - Diabète
  - **Antibiothérapie préalable**
  - Pathologie sous-jacente (diarrhée, vessie neuro)

Physiopathologie

Colonisation : 3 portes d'entrée

RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA PRÉVENTION

Infections liées au cathéters veineux

DÉFINITION D'UNE INFECTION LIÉE AU CATHÉTER VEINEUX CENTRAL

- ILC
  - Culture CVC $\geq 10^3$ ufc/ml
- ET
  - Régression totale ou partielle dans les 48 h après Ablation
- ou
  - Orifice purulent ou tunnelite

(consensus SRLF 2002)?

PATHOGENÈSE DE L'INFECTION DE KTVC

Potential Sources for Contamination of Intravascular Devices

Source: Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta.

RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA PRÉVENTION DES INFECTIONS DE CVC

- Protocoliser, et évaluer périodiquement
- Former les personnels
  - pose/manipulation de CVC
- Hygiène des mains:
  - pose, pansements, manipulations

Habillage des opérateurs

RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA PRÉVENTION DES INFECTIONS DE CVC

Entretien et manipulations

- Limitation manipulations et ouvertures de voie
  - Notion de système clos
  - Avant manipulation: Désinfection embouts/robinets
  - Connecteurs de sécurité possibles si désinfectés avant utilisation

RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA PRÉVENTION DES INFECTIONS DE CVC

Entretien et manipulations

- Contrôle visuel ou palpation 1/j
- Changement du pansement uniquement si décollé ou souillé
- Changement des tubulures après:
  - chaque transfusion
  - dans les 24h suivant produits lipidiques

Equipe opérationnelle d'Hygiène Hospitalière et de Prévention des Infections Nosocomiales

Composition

- Médecin / *Pharmacien* (1/800 lits)
- Infirmiers (1/400 lits)
- Secrétariat commun avec CLIN

Missions

- Mise en œuvre et évaluation de programme
- Recommandations techniques
- Surveillance
- Formation
- Investigations et interventions

II EST IMPORTANT de collaborer entre les différents intervenants !!!!

*MEDECINS

*PHARMACIEN

*MICROBIOLOGISTE

*DIRECTION

PROTOCOLE

- Ecrit avec toute l'équipe
- Situations cliniques
  - curatif et prophylaxie
- Antibiotiques
  - nature, voie, posologie
  - durée
  - alternative
- **Accessible à tous**
- **Révision annuelle**
- **Evaluation du respect du protocole**

PRÉCAUTIONS STANDARDS

- Hygiène des Mains

OU

Eau+savon

Solution Hydro-Alcoolique

- Port de gants

~~Germes~~
~~AES~~

Gants = 1 soin = 1 patient
Gants ôtés = hygiène des mains

- Surblouses

Si risque de projection

- Masques Lunettes

si risque de projection ou d'aérosolisation

CONCLUSIONS

- La prise en charge des IAS: **affaire de tous et de chacun**
- Intérêt de: **la surveillance et la prévention**
- Nécessité de mise en œuvre d'**un programme multidisciplinaire**
- L'infirmier: **acteur principal** de ce programme

RÔLE PRINCIPAL:

- Promouvoir le développement et l'amélioration des techniques de soins infirmiers,
- Procéder à l'examen en **continu** des pratiques quotidiennes en matière d'asepsie afin de limiter l'exposition des patients aux infections
- Participer au comité de lutte contre les infections nosocomiales

FORMATION CONTINUE = SIMULATION