Introduction

- Ebola virus : famille des Filoviridae (filovirus)
- 5 Espèces :
 - Les espèces Bundibugyo, Soudan et **Zaire** ont été associés à d'importantes flambées de maladie à virus Ebola (MVE), caractérisées par une transmission interhumaine élevée et causant la mort de 25 à 90 % des personnes infectées
 - Les espèces Forêt de Tai et Reston n'ont pas été associés, pour le moment, à des flambées chez l'homme

Année	Pays	Sous-type du virus	Nombre de cas	Nombre de décès	Taux de létalité
2012	République démocratique du Congo	Ebola Bundibugyo	57	29	51%
2012	Ouganda	Ebola Soudan	7	4	57%
2012	Ouganda	Ebola Soudan	24	17	71%
2011	Ouganda	Ebola Soudan	1	1	100%
2008	République démocratique du Congo	Ebola Zaïre	32	14	44%
2007	Ouganda	Ebola Bundibugyo	149	37	25%
2007	République démocratique du Congo	Ebola Zaïre	264	187	71%
2005	Congo	Ebola Zaïre	12	10	83%
2004	Soudan	Ebola Soudan	17	7	41%
2003	Congo	Ebola Zaïre	35	29	83%
2003	Congo	Ebola Zaïre	143	128	90%
2001-2002	Congo	Ebola Zaïre	59	44	75%
2001-2002	Gabon	Ebola Zaïre	65	53	82%
2000	Ouganda	Ebola Soudan	425	224	53%
1996	Afrique du Sud	Ebola Zaïre	1	1	100%
1996	Gabon	Ebola Zaïre	60	45	75%
1996	Gabon	Ebola Zaïre	31	21	68%
1995	République démocratique du Congo	Ebola Zaïre	315	254	81%
1994	Côte d'Ivoire	Ebola Forêt de Taï	1	0	0%
1994	Gabon	Ebola Zaïre	52	31	60%
1979	Soudan	Ebola Soudan	34	22	65%
1977	République démocratique du Congo	Ebola Zaïre	1	1	100%
1976	Soudan	Ebola Soudan	284	151	53%
1976	République démocratique du Congo	Ebola Zaïre	318	280	88%

D

	# Total	# Patients	% Coverage	x Coverage
Batch 1	15	12	99.77%	555 [16-23,042]
Batch 2	84	66	99.91%	2,186 [6-18,623]
Combined	99	78	99.88%	2,048 [6-23,042]
Replication	140	78	99.39%	2,109 [8-17,537]

L'épidémie actuelle a commencé en Février 2014 en Guinée et s'est propagée vers le Libéria en Mars, la Sierra Leone en mai et le Nigeria à la fin de Juillet. C'est la plus grande épidémie et se développe de manière exponentielle, avec une période de doublement 35 jours

A la date du 16 Novembre 2014 (OMS)

Maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo

Genome sequencing revealed Ebola virus (EBOV, Zaire species)

Figure 1. Geographic Location of Patients in the EVD Outbreak in the Democratic Republic of Congo (July 26–October 7, 2014). The inset map shows the location of the towns and villages in the vicinity of Boende town, Équateur province, site of the recent EVD outbreak.

EBOLA COMMENT EMPÊCHER SA PROPAGATION

**Ebola se propage rapidement et peut tuer les personnes infectées.
Comment se protéger ?**

1 Éviter de toucher...

2 Lavons-nous toujours les mains

3 Signalons toute personne présentant des signes au Centre de Santé

Mettre en place un système pour la collecte, l’emballage, le stockage et le transport des échantillons pour le laboratoire

- Disposer de matériel de prélèvement d’échantillons et de tenues de protection individuelle au niveau des districts à risque
- Connaître et appliquer les principes directeurs pour le prélèvement, l’emballage, le stockage et le transport des échantillons prélevés sur des cas suspects de FHV ([annexe 6](#))
- Disposer des boîtes et des récipients adéquats pour assurer un transport dans un triple emballage des échantillons prélevés sur des cas suspects de FHV ([annexe 7](#))
- Disposer de l’adresse exacte du ou des laboratoires nationaux de référence
- Connaître le circuit d’expédition des échantillons au laboratoire national de référence
- Poursuivre la collaboration avec le ou les laboratoires de référence nationaux.

NB : c'est le laboratoire national de référence qui est responsable de l'expédition des prélèvements aux laboratoires internationaux centres collaborateurs de l'OMS pour le diagnostic des fièvres hémorragiques à virus Ebola et Marburg ([annexe 8](#)).

Le laboratoire National de référence en Tunisie est le
laboratoire de virologie de l’IPT

Mettre en place un système pour la collecte, l’emballage, le stockage et le transport des échantillons pour le laboratoire

Figure 9. Exemple de système du triple emballage pour l’emballage et l’étiquetage des matières infectieuses de la catégorie B (figure aimablement communiquée par l’IATA, Montréal, Canada)

Le laboratoire National de référence en Tunisie est le laboratoire de virologie de l’IPT

LES VOYAGES À DESTINATION OU EN PROVENANCE DES PAYS TOUCHÉS PAR EBOLA PRÉSENTENT UN RISQUE FAIBLE VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

PENDANT LE VOYAGE

Si vous-même avez de la fièvre et présentez ces symptômes, informez-en immédiatement le personnel de la compagnie aérienne.

fièvre, faiblesse, douleurs musculaires, céphalées et mal de gorge, suivis de vomissements, diarrhée, hémorragies.

Alertez le personnel de la compagnie aérienne si un autre voyageur présente des symptômes de maladie à virus Ebola:

À L'AÉROPORT ET À VOTRE DESTINATION

NE TOUCHEZ PAS le corps d'une personne décédée de la maladie à virus Ebola.

Évitez le contact physique direct avec quiconque présente des symptômes de maladie à virus Ebola.

Utilisez une solution hydroalcoolique tout au long de la journée. Lorsque vos mains sont visiblement sales, lavez-les à l'eau et au savon.

Si vous présentez des symptômes d'Ebola, consultez immédiatement un médecin.

Organisation mondiale de la Santé

- Dans les pays endémiques :
 - Malheureusement, ce personnel médical qualifié manque cruellement dans les pays touchés
 - Il y a eu beaucoup de promesses de plusieurs pays, mais les déploiements sont extrêmement lents. Ce qui fait que la maladie gagne de plus en plus de terrain
 - Beaucoup de pays veulent appuyer logistiquement, veulent envoyer des médicaments, veulent envoyer du matériel de protection, mais dès qu'on parle d'envoyer du personnel beaucoup d'experts de santé, finalement n'acceptent pas tout simplement d'aller dans ces 3 pays"