INDICATIONS DES ANTIFONGIQUES DANS LES PÉRITONITES POST-OPÉRATOIRES GRAVES

Pr Ag BECEM TRABELSI
Service d'Anesthésie Réanimation
Hôpital Universitaire Mohamed Tahar Maamouri de NABEUL
JCOR 31/05/2025

Conflits d'intérêt

Aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation

INTRODUCTION

- *Candida spp.* : 1^{er} agent responsable des infections fongiques invasives
- **Les candidoses invasives** regroupent :
 - candidémies
 - « *deep-seated invasive infections* »
- **PPO fongiques → mortalité très élevée 50% !**
- Définition des PPO fongiques n'est pas consensuelle
- **Difficulté de faire la différence entre INFECTION et COLONISATION à *Candida* dans le péritoine !**
- **Urgence diagnostique et thérapeutique !**

PHYSIOPATHOLOGIE

Candida : levure commensale du TD ;
se développe en milieu acide et aérobie

- Symbiose !
- Toute effraction du TD → présence de *Candida* dans le péritoine :
 - *Candida albicans*
 - *Candida glabrata*
 - *Candida parapsilosis*
 - *Candida tropicalis*
 - *Candida krusei*...

Existe-t-il une réelle pathogénicité dans le péritoine ?

PHYSIOPATHOLOGIE

CLASSIFICATION & MÉCANISMES DE DÉFENSE

- Les péritonites sont classées en :
 - **Primaire** : sans effraction du TD (**mono-microbienne**)
 - **Secondaire** à une effraction du TD (**poly-microbienne**)
PPO (lâchage de sutures, plaie digestive...)
 - **Tertiaire** : persistante malgré un traitement bien conduit
- Deux mécanismes de contrôle de l'infection péritonéale :
 1. visant à circonscrire l'infection
 2. *Clairance microbienne rapide par le système lymphatique : courants liquidiens dirigés vers les stomates diaphragmatiques*

→ MALADIE SYSTÉMIQUE !

CHIRURGIE

CONTRÔLE DE LA SOURCE

- **Pierre angulaire du traitement étiologique !**
- Toilette péritonéale avec lavage abondant
- Tout retard est associé à une surmortalité notamment en cas d'EDC septique !
- PPO : indications opératoires **larges** + **précoces**
- Une laparotomie « *blanche* » vaut mieux qu'un sepsis dépassé

CHIRURGIE

PRÉLÈVEMENT PÉRITONÉAL

- Systématique
- Prendre quelques précautions :
 - ✓ Risque de contamination → acheminement rapide
 - ✓ Conserver au froid ou inoculer sur des milieux de transport
 - ✓ Un seul prélèvement en cas d'*épanchement libre*
 - ✓ Des prélèvements multiples recommandés en cas d'*épanchements cloisonnés*
 - ✓ La culture des drainages non recommandée

*Risque de contamination
par les flores cutanées et
de l'environnement*

MICROBIOLOGIE

EXAMEN DIRECT (ED) DU LIQUIDE PÉRITONÉAL À LA RECHERCHE DE LEVURES

Recommandé !

- Ne permet pas de prédire le caractère pathogène
- Arguments d'une **infection active à *Candida*** :
 1. Présence de levures à l'ED → **inoculum fongique important**
ED (+) *Candida* → surmortalité !
 2. Filamentation des *Candida* visible à l'ED (sauf *C. glabrata* : ne filamente pas)
- L'absence de *Candida* à l'ED n'élimine pas leur présence à la culture (mauvaise sensibilité)

Table 5. Independent Risk Factors Associated With ICU Mortality in Patients With *Candida* Peritonitis*

Variable	β (SD)†	Odds Ratio (95% CI)	P Value
APACHE II score >17	3.35 (0.82)	28.4 (5.7-142.5)	<.00
Respiratory failure	2.36 (0.80)	10.6 (2.2-51.2)	.00
Upper gastrointestinal tract origin	2.05 (0.76)	7.8 (1.7-34.7)	.00
Results of DE positive for <i>Candida</i>	1.56 (0.73)	4.7 (1.2-19.7)	.02
Constant	-3.79 (0.91)	...	<.00

MICROBIOLOGIE

TECHNIQUES CONVENTIONNELLES

- Hémocultures (HC) avant antifongiques : Péritonite = Maladie systémique !

- « standards » + « fongiques »
- 2 ou 3 HC avec chacune **20 ml de sang**
- Sensibilité ↗ avec :
 - ✓ *le nombre de flacons incubés*
 - ✓ *le vol sang collecté*

- Délai de positivité plus long que celui des bactéries → **prolonger les cultures !**
- L'**antifongigramme** permettra d'adapter l'antifongique probabiliste
- Nécessite 24 à 48h de plus
- Biologie moléculaire : peu appliquée aux PPO (**infection polymicrobienne**)

BIOMARQUEURS

β -D-glucane

- **β -D-glucane** est un polysaccharide de la paroi cellulaire fongique
- *Limites* : Spécificité et VPP médiocres
- **VPN (jusqu'à 98 %)**
- **Norme fixée à 80 pg/ml**
- *Intérêts* :
 - Arrêt du traitement probabiliste
 - Suivi de l'efficacité du traitement

Les principales causes de faux positifs du -D-glucane

Hémodialyse

Bactériémies (Gram positif et négatif)

Antibiotiques (pipéracilline-tazobactam ou amox-clav)

Produits dérivés du sang (immunoglobulines, albumine, facteurs de coagulation)

Mycose sévère

Matériel contenant du glucan (compresses chirurgicales)

Manipulation excessive de l'échantillon

INDICATIONS DU TRAITEMENT ANTIFONGIQUE

Le diagnostic des PPO à *Candida* très difficile :

- Clinique pauvre
- ED difficile et peu sensible
- Cultures lentes
- Biomarqueurs non spécifiques

INDICATIONS DU TRAITEMENT ANTIFONGIQUE

Antifongiques pour toutes les PPO ?

- La prescription excessive des antifongiques est **dangereuse** :
 - **Pression de sélection** : émergence d'espèces naturellement résistantes aux antifongiques de 1^{ère} ligne (*C. glabrata*, *C. Krusei*)
 - ↗ **du risque résistances acquises** : émergence de « difficult-to-treat *Candida* »
 - **Émergence de *C. auris* (2009)** :
 - ✓ Problème mondial de santé
 - ✓ Multirésistance aux antifongiques
 - ✓ Potentiel de provoquer des épidémies

Prescription fondée sur un raisonnement !

INDICATIONS DU TRAITEMENT ANTIFONGIQUE

• Question 1 : Existe-t-il des facteurs de risque de levures ?

« **Peritonitis score** » : 4 items associés à la présence de *Candida* :

- *sexe féminin*
- *origine sus-mésocolique*
- *un état de choc*
- *une antibiothérapie antérieure (> 48h)*

¾ critères : sensibilité 84%
et une spécificité de 50%

• Question 2 : Colonisation ou infection ? en faveur d'une infection :

- Présence de *Candida* à l'ED du liquide péritonéal
- Caractère filamenteux (sauf pour *C. glabrata*)
- Dosage du β -D-glucane > 80 pg/ml

Antifongique dans l'heure
Aucun risque de « négativer » le prélèvement péritonéal

QUEL ANTIFONGIQUE CHOISIR ?

• Les principales classes d'antifongiques :

1. Azolés (Fluconazole) : fongistatique

- (-) cytochrome P-450 (ergostérol) → interactions
- DDC 12 mg/kg/j puis 6 mg/kg/j

2. Échinocandines : fongicides (-) Glucane synthétase

• Caspofungine :

- DDC 70 mg DE 50 mg (si < 80 kg)
- ou 70 mg (si > 80 kg) → ICU DDC 140 mg
- Anidulafungine DDC 200 mg puis 100 mg
- Micafungine ; Rézafungine (prise hebdomadaire)

3. Polyènes (Amphotéricine B) : fongicide ; toxique

Cornely, *Lancet Infect Dis.* 2002
Bailly, *Antimicrob Agents Chemother* 2002
Gow, *Microbiol Spectr* 2017

QUEL ANTIFONGIQUE CHOISIR ?

L'identification de l'espèce permet **le plus souvent d'adapter l'antifongique**

	Ampho B	Fluconazole	Voriconazole	Echinocandines
<i>Candida albicans</i>	S	S	S	S
<i>Candida tropicalis</i>	S	S/SDD	S	S
<i>Candida parapsilosis</i>	S	S	S	S/I
<i>Candida krusei</i>	S/I	R	S	S
<i>Candida glabrata</i>	S/I	I/R	S/I/R	S

AmarCand study
(péritonites à *Candida*) :
 émergence d'espèces
 résistantes au fluconazole
 comme *C. glabrata* et *C. krusei*

QUEL ANTIFONGIQUE CHOISIR ?

Survival according to presence of yeasts in postoperative peritonitis (%)

Mortalité plus élevée pour les péritonites avec levures par rapport aux péritonites sans levures

Mortalité plus importante en cas d'EDC septique associé

→ **Stratégie agressive : échinocandine en empirique :**

- Désescalade après identification + antifongogramme
- Arrêt si les prélèvements sont négatifs

Riché, *Clin Microbiol Infect* 200

Pappas, *CID* 201

Sartelli, *World J Emerg Surg* 201

Mazuski, *Surg Infect* 201

Montravers, *Anaesth Crit Care Pain Med* 201

QUEL ANTIFONGIQUE CHOISIR ?

POUR QUELLE DURÉE ?

- La durée n'est pas clairement établie :
 - **Si candidémie associée** : 14j à compter de la 1^{ère} hémoculture négative
 - **PPO** : 8-14 jours
- Durée adaptée selon :
 - la qualité du **contrôle de la source**
 - et la réponse clinique
- Utiliser des biomarqueurs (β -D-glucane) pour arrêter l'antifongique

Bassetti, *ICM* 20

Sartelli, *World J Emerg Surg* 20

Rouzé, *ICM* 20

Cornely, *Clin Microbiol Infect* 20

EN PRATIQUE

Indications des antifongiques dans les PPO graves

PRATIQUE

USA : IDSA 2016 / Surgical Infection Society 2017

- ED (+) levures
- Facteurs de risque :
 - ✓ Perforation sus mésocolique
 - ✓ Pancréatite aiguë nécrosante
 - ✓ Pancréatite traitée chirurgicalement
 - ✓ Perforations intestinales récurrentes
 - ✓ ATB prolongée large spectre
 - ✓ Colonisation connue à *Candida*

France SFAR 2015

- ED (+) levures
- 3 critères/4 « *Peritonitis score* » :
 - ✓ Sexe féminin
 - ✓ Défaillance HMD
 - ✓ Chirurgie sus mésocolique
 - ✓ ATB depuis > 48h

Pappas, CID 201

Sartelli, World J Emerg Surg 201

Mazuski, Surg Infect 201

Montravers, Anaesth Crit Care Pain Med 201

EN PRATIQUE

EN PRATIQUE

Dans notre pratique → **Fluconazole** ; Quatre raisons :

1. **PK** : petites molécules qui pénètrent mieux que les échinocandines dans le péritoine
2. **Écologique** : P° de sélection des échinocandines
3. **Économique** : Coût !
4. **LE CHIRURGIEN EST LE MEILLEUR ANTIFONGIQUE !**

Molécule	Coût	Cure de 10j
Caspofungine 70mg	1200 DT	≈ 10000 DT
Caspofungine 50mg	950 DT	
Anidulafungine 100mg	1170 DT	≈ 13000 DT
Fluconazole 200 mg	10 DT	≈ 220 DT

Taddei, *Antibiotics* 2021
Gioia, *Int J Infect Dis* 2021

Felton, *Clin Microbiol Rev* 2017

Shields, *Antimicrob Agents Chemother* 2017

TAKE HOME MESSAGES

- L'absence d'études prospectives ne permet d'émettre des recommandations claires
- Prescrire les antifongiques pour les PPO :
 - ✓ avec signes de gravité
 - ✓ **ET** en présence de FDR
- PEC multidisciplinaire : chirurgien, microbiologiste...

RAPIDITÉ + QUALITÉ DU CONTRÔLE DE LA SOURCE

= PILIERS DE LA PEC