


ENQUETE SUR LA SECURISATION DES PROCEDURES




Jaoued O, Tilouche N¹, Ben sik ali H¹, Mater H¹, Gharbi R¹, Fekih hassan M¹, Elatrous S¹.

Service de Réanimation médicale de l'hôpital EPS Taher Sfar.



Introduction :

- La sécurisation des procédures à risques est une démarche qui permet d'identifier et de traiter les différentes sources de risques afin de réduire au minimum le risque pour les patients.
- Le taux de complications mécaniques précoces de la mise d'un cathéter central est élevé même pour des opérateurs expérimentés.
- Actuellement, la pose échoguidée bidimensionnelle en temps réel est la méthode de référence d'insertion des CVC en jugulaire interne chez l'adulte et l'enfant.



Objectif:




- Evaluer les pratiques de l'utilisation de l'échographie pour la mise en place d'un cathéter central.



Matériels et Méthodes :



- Un questionnaire était envoyé à 6 services du sahel Tunisien (5 services de Réanimations et un service des urgences).
- Il se composait au total de 16 questions.
- Les items portaient sur:
 - le statut de l'interrogé,
 - L'utilisation ou non de l'échographie pour la pose d'un cathéter central.
 - Les formations reçues concernant l'apprentissage de l'échographie et son type .
 - L'utilisation de l'échographie pour optimiser la prise en charge en réanimation.



Résultats :




Caractéristiques générales:




	N:40
Ancienneté en réanimation, ans , n(%) ✓ < 5 ans ✓ Entre 5 et 10 ans ✓ > 10	29(72.5) 9(22.5) 2(5)
Statut , n(%) ✓ Résident ✓ Assistant ✓ Professeur	35(87.5) 3(7.5) 2(5)
Spécialité , n(%) Réanimation Médicale Réanimation et Anesthésie Urgences	19(47.5) 13(32.5) 8(20)
Nombre de voies veineuses posées durant sa carrière ✓ <25 ✓ Entre 25 et 50 ✓ >50	5(12.5) 8(20) 27(67.5)
Nombre de voies veineuses posées au cours de la dernière année, n(%) ✓ < 1/mois ✓ Entre 1 -2/mois ✓ > 2/mois	3(7.5) 14(35) 23(57.5)

Utilisation de l'échographie pour mise en place d'un KT central




Les raisons de la non utilisation de l'échographie:




■ inutile

■ connaissance parafaites des repères anatomiques

■ Échographie non disponible




Objectifs de l'utilisation de l'échographie



FORMATION REÇUE : 16 MEDECINS




■ Congrès ■ Collèges ■ Autres



✓ Formation pratique sur mannequin : 62.5%

Indications utiles de l'échographie en réanimation



Conclusion :



- L'utilisation de l'échographie pour sécuriser les gestes en réanimation est peu utilisée.
- Des efforts doivent être fournis pour assurer une formation adéquate et touchant tous les réanimateurs.

