

LART: Données de 2019

A. baumannii

N=1037

Répartition des souches d'*A.baumannii* selon les centres

Centre	Nombre (%) de souches	Pourcentage des souches résistantes à l'imipénème
Hôpital Habib Bourguiba de Sfax	264	25,4
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	141	13,5
Hôpital d'enfants de Tunis	31	2,9
Hôpital la Rabta	176	12,9
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	39	0,3
Centre de greffe de moelle osseuse	7	0,6
Hopital Abderrahmen Mami Ariana	116	11,1
Centre de traumatologie et des grands brûlés	256	24,6
Hôpital Aziza Othmana	4	0,3
Total	1037	74

Distribution des souches de *A. baumannii* selon le prélèvement

Prélèvement	Nombre	%
Urines	163	14,7
Prélèvements pulmonaires	390	35,3
Ponctions	21	1,9
Hémocultures	207	18,7
Pus	124	11,2
Matériel	143	12,9
Prélèvements vaginaux	1	0,01
Autres	54	4,9
Total	1102	100

Distribution des souches de *A. baumannii* selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	210	19,8
Médecine	77	7,2
Gynécologie	4	0,3
Néonatalogie	33	3,1
Pédiatrie	37	3,5
Ambulatoire	35	3,2
Réanimation	45	4,1
Urgences	598	56,5
Onco-hématologie	18	1,7
Total	1057	100

Taux de résistance aux antibiotiques d' *A. baumannii*

	Total N= 1037			Hémocultures N=207			Pulmonaire N=390		
	nombre	%R	% R+I	nombre	%R	%R+I	nombre	%R	%R+I
Ticarcilline	849	84,0	85,0	155	85,8	87,1	321	92,8	93,5
Pipéracilline	924	92,4	93,8	183	90,2	91,8	339	95,0	95,9
Pipéracilline+ Tazobactam	932	87,3	90,8	178	86,5	88,7	354	92,4	93,5
Céftazidime	900	83,8	89,2	169	83,4	85,8	331	91,5	92,4
Céfépime	835	82,4	86,8	164	81,7	83,5	303	92,1	93,1
Imipénème	944	84,2	85,5	176	80,7	82,3	346	91,6	93,1
Gentamicine	775	83,0	83,0	132	80,3	80,3	309	87,7	87,7
Tobramycine	696	75,4	75,4	137	78,1	78,1	247	82,2	82,2
Amikacine	833	80,4	81,3	169	78,7	79,2	323	87,9	87,9
Ciprofloxacine	790	87,7	89,5	154	85,1	88,3	310	93,5	95,2

Souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipenème

Antibiotiques	R		R+I
	N	%	%
Ticarcilline	678	100	100
Pipéracilline	706	100	100
Pipéracilline+Tazobactam	716	100	100
Céftazidime	716	95,0	99,2
Céfepime	675	95,6	99,7
Gentamicine	620	93,5	93,5
Tobramycine	529	88,7	88,7
Amikacine	649	93,7	94,8
Ciprofloxacine	628	99,5	99,7
colistine	145	3,4	3,4


Prévalence des souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les services

	Nombre de souches imipénème - résistantes	Nombre total de souches	%
Chirurgie	148	210	70
Médecine	43	77	55,8
Néonatalogie	21	33	63,6
Pédiatrie	21	37	56,7
Ambulatoire	18	35	51,4
Réanimation	27	45	60
Urgences	532	598	88,9
Onco-hématologie	9	18	50
Total	822	1057	77,7

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les prélèvements

	Nombre de souches imipénème - résistantes	Nombre total de souches	%
Urines	148	163	66,8
Prélèvements pulmonaires	43	390	86,9
Ponctions	21	21	66,6
Hémocultures	21	207	74,8
Pus	18	124	59,6
Matériels	532	143	86,7
Autres	39	54	72,2
Total	27	1102	77,4

Evolution annuelle de la résistance de *A. baumannii* à l'imipénème



Evolution annuelle de la résistance de *A. baumannii* à la colistine

