Enseignement Post Universitaire

Actualités dans la Prise en Charge des Etats de Mal Epileptique

Epidémiologie , Définitions et Classification

10/05/2013

- Bourneville DM. Recherches cliniques et therapeutiques sur l'epilepsie et l' hysterie Paris: Dilahaye, 1876

Historique

- 1981 : ILAE (international league against epilepsy):

“a seizure that persists for a **sufficient** length of time or is repeated **frequently** enough that recovery between attacks does not occur”

- 1993 :the epilepsy foundation of America
(sur modèles animaux)

“continuous seizure activity or intermittent seizure activity without the recovery of consciousness that lasts longer than 30 min”

- Neuronal injury ?
- Morbimortalité augmente si durée ≥ 30 min.
- 5, 10 et 20 minutes

«Toute crise qui dure 5 min ou plus mérite une intervention immédiate et attentive.»

« Toute crise qui dure plus de 5 minutes ou la succession de deux crises ou plus sans retour à un état de conscience normal entre les crises »

Epidémiologie

- 10 à 41 par 100000 habitants par an en europe ^[1].
- 14000 patients par an en UK ^[2]
- 69 % débutent par des crises focales [3]
- Age supérieur à 60 ans
- Sexe masculin

1- Prise en charge en situation d'urgence et en réanimation des états de mal épileptiques de l'adulte et de l'enfant (nouveau-né exclu). Réanimation (2009) 18, 4—12

2 - Walker MC, Smith SJ, Shorvon SD. The intensive care treatment of convulsive status epilepticus in the UK. Results of a national survey and recommendations. Anaesthesia 1995;50(2):130—5.

3 - Nair P P, Kalita J, Misra U K. Status epilepticus: Why, what, and how. J Postgrad Med 2011;57:242-52

« Il existe autant de formes d'états de mal épileptiques
qu'il existe de formes d'épilepsies »

Gastaut H, 1983

Classification

- EME convulsive
- EME non convulsive : EEG
- Classification opérationnelle

États de Mal Épileptiques

```
graph TD; A[États de Mal Épileptiques] --> B[Convulsifs]; A --> C[Non Convulsifs]; B --> D[Partiels Moteurs]; B --> E[Tonico-Cloniques]; B --> F[Toniques]; B --> G[Cloniques]; B --> H[Myocloniques]; C --> I[Généralisés d'emblée ou secondairement];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a dark red rounded rectangle containing the text 'États de Mal Épileptiques'. A horizontal line below it branches into two arrows pointing to 'Convulsifs' (left) and 'Non Convulsifs' (right). From 'Convulsifs', a horizontal line branches into five arrows pointing to 'Partiels Moteurs', 'Tonico-Cloniques', 'Toniques', 'Cloniques', and 'Myocloniques'. From 'Non Convulsifs', a single arrow points down to 'Généralisés d'emblée ou secondairement'. All boxes are dark red with white text and rounded corners.

Convulsifs

Non Convulsifs

Partiels Moteurs

Tonico-Cloniques

Toniques

Cloniques

Myocloniques

Généralisés d'emblée ou secondairement

États de Mal Épileptiques

```
graph TD; A[États de Mal Épileptiques] --> B[Convulsifs]; A --> C[Non Convulsifs]; C --> D[Absences]; C --> E[Complexes Partiels]; C --> F[Électrographiques]; C --> G[Partiels Simples]; F --> H[Larvé]; F --> I[Coma];
```

The diagram is a hierarchical flowchart titled "États de Mal Épileptiques". It starts with a root node at the top, which branches into two main categories: "Convulsifs" and "Non Convulsifs". The "Non Convulsifs" category further branches into four sub-categories: "Absences", "Complexes Partiels", "Électrographiques", and "Partiels Simples". The "Électrographiques" sub-category is further divided into two sub-sub-categories: "Larvé" and "Coma". All nodes are represented by rounded rectangular boxes with a dark orange background and white text. The boxes are connected by black lines with arrowheads pointing downwards.

Convulsifs

Non Convulsifs

Absences

Complexes Partiels

Électrographiques

Partiels Simples

Larvé

Coma

Classification en fonction du degrés de mise en jeu du pronostic

1. EME avec pronostic vital engagé à court terme :
 1. EME convulsif tonicoclonique généralisé ou secondairement généralisé
 2. EME larvé : l'atténuation, voire disparition des manifestations motrices chez un patient comateux contrastant avec la persistance d'un EME électrique et ce au décours d'un EME convulsif.
2. EME avec pronostic vital et/ou fonctionnel engagé à moyen terme:
 1. EME confusionnel partiel complexe
 2. EME convulsif focal avec ou sans marche Bravais Jacksonienne

3. EME n'engageant pas le pronostic vital à court terme:
- EME convulsif généralisé myoclonique
 - EME absence
 - EME à symptomatologie élémentaire donc sans rupture de contact (hallucinations, aphasie . . .)
 - épilepsie partielle continue

1- Nair P P, Kalita J, Misra U K. Status epilepticus: Why, what, and how. J Postgrad Med 2011;57:242-52

2 - Prise en charge en situation d'urgence et en réanimation des états de mal épileptiques de l'adulte et de l'enfant (nouveau-né exclu). Réanimation (2009) 18, 4—12

MERCI