CAS CLINIQUE

EPU LA RABTA 28 Mai 2010

LABORATOIRE MEDIS

Dr El Ghord Hatem AHU CAMU

Motif d'hospitalisation

- Patiente de 25 ans
- transférée de L'Hôpital régional de Nabeul le 17 Mai 14 H pour:
- suspicion de céto-acidose inaugurale.

Histoire

Histoire

- Depuis le 16 Mai 20 H:
 - Vomissements
 - Douleurs abdominales
 - Asthénie profonde

Histoire

- Depuis le 16 Mai 20 H:
 - Vomissements
 - Douleurs abdominales
 - Asthénie profonde
- Consulte l'Hôpital régional de Nabeul 06H
 - TA 130/90 mmHg, Pouls 106/min, FR 30 c/min
 - GAD 0,46g/l,
 - (après 4 amp. de G30% et 1000 ml SG10%) → GAD: HI
 - Auscultation libre, SpO2: 100%
 - Sensation de soif, langue sèche
 - Adressée au CAMU

Antécédents

Antécédents

- **Antécédents personnels: RAS**

Antécédents

- **Antécédents personnels: RAS**
- **Antécédents familiaux:**
 - **Père :**
 - Diabétique sous Glibenclamide et Metformine
 - Hypertendu sous Captopril et acide acétylsalicylique.
 - **Soeur:** épileptique sous Valproate sodique
 - **Frère:** traité pour Tuberculose ganglionnaire

A l'arrivée

A l'arrivée

- Patiente somnolente
 - Dextro 5,97 g/l
 - Bandelette urinaire G:+++ / A:0

A l'arrivée

- Patiente somnolente
 - Dextro 5,97 g/l
 - Bandelette urinaire G:+++ / A:0
- FR 43c/min, sans signes de lutte
 - Auscultation libre

A l'arrivée

- Patiente somnolente
 - Dextro 5,97 g/l
 - Bandelette urinaire G:+++ / A:0
- FR 43c/min, sans signes de lutte
 - Auscultation libre
- Pouls: 123b/min, TA: 110/63 mm Hg
 - Extrémités froides.

Suite examen clinique

Suite examen clinique

- **Abdomen** : épigastralgie sans autres anomalies

Suite examen clinique

- **Abdomen** : épigastralgie sans autres anomalies
- **Neuro**: somnolente,
 - réveillable,
 - absence de syndrome méninge.
 - ROT normaux

Autres examen complémentaires

- ECG: tachycardie sinusale
- Rx Thorax : sans anomalies

A ce stade

- A quel (s) diagnostic(s) pensez vous?
- Que faites vous?

Bilogie

	Valeurs	Valeurs normales
Glycemie (mmol/l)	26	3,6-6,1
Uree (mmol/l)	5,6	2,5 - 7,5
Creatinine (μ mol/l)	178	55-120
Soduim (mmol/l)	139	135-145
Potassium(mmol/l)	3,7	3,5-4,8
Chlorures (mmol/l)	102	97-107
Creatine Kinase(UI/l)	59	<195
LDH (UI/l)	394	230-460
Amylase (UI/l)	93	<100
Calcium (mmol/l)	2,2	2,1 - 2,6
ASAT(UI/L)	112	5-40
ALAT(UI/L)	82	5-40

Numération et Formule Sanguine

	Valeurs	Valeurs normales
GB (e/mm ³)	54900	4000-10000
GR (e/mm ³)	5240000	4- 5,5 x 10 exp 6
Hb g/dL	13,5	11-17
Hématocrite %	44	35-50
VGM μm ³	84	80-97
Plaquettes (e/mm ³)	352000	150000-450000
Neutro %	92	50-75
Lympho %	8	20-40

Gaz du sang

	VS + AA	Valeurs normales
pH	6,85	7,4 ± 0,2
PaCO ₂ (mm Hg)	17	40 ± 2
PaO ₂ (mm Hg)	121	100 ± 5
SaO ₂ %	96 %	100 ± 5
HCO ₃ ⁻ (mmo/L)	3,2	24 ± 2

Et maintenant

- Que retenez vous?

Trou anionique (anion Gap)

- $TA = (139 + 3,7) - (102 + 3,2)$
- $TA = 37,5 > 20 \text{ Meq/l}$
- AM Par excès de H^+

A la reprise de l'interrogatoire

- Notion de conflit et prise de médicaments non précisés dans l'armoire a médicaments.
- Aucune notion de polyuropolydypsie.
- Que dosez vous?
- Que faites-vous?

Rappel

- **Antécédents personnels: RAS**
- **Antécédents familiaux:**
 - **Père :**
 - Diabétique sous Glibenclamide et Metformine
 - Hypertendu sous Captopril et acide acétylsalicylique.
 - **Soeur:** épileptique sous Valproate sodique
 - **Frère:** traité pour Tuberculose ganglionnaire

Produits possible

- Valproate sodique
- Isoniazide
- Acide acétyle - salicylique
- Metformine

Dépakinémie
ND
Salicylémie
ND

Bilan neuf

Bilan neuf

	Valeurs	Valeurs normales
Glycemie (mmol/l)	11	3,6-6,1
Uree (mmol/l)	4,1	2,5 - 7,5
Creatinine (μ mol/l)	199	55-120
Soduim (mmol/l)	133	135-145
Potassium(mmol/l)	4,4	3,5-4,8
Chlorures (mmol/l)	98	97-107
Bilirubine(μ mol/l)	12	<20
Gamma GT (UI/l)	22	10-50
Amylase (UI/l)	93	<100
Calcium (mmol/l)	1,94	2,1 - 2,6
ASAT(UI/L)	108	5-40
ALAT(UI/L)	75	5-40

Bilan neuf

	Valeurs	Valeurs normales
Glycemie (mmol/l)	11	3,6-6,1
Uree (mmol/l)	4,1	2,5 - 7,5
Creatinine (μ mol/l)	199	55-120
Soduim (mmol/l)	133	135-145
Potassium(mmol/l)	4,4	3,5-4,8
Chlorures (mmol/l)	98	97-107
Bilirubine(μ mol/l)	12	<20
Gamma GT (UI/l)	22	10-50
Amylase (UI/l)	93	<100
Calcium (mmol/l)	1,94	2,1 - 2,6
ASAT(UI/L)	108	5-40
ALAT(UI/L)	75	5-40

Lactates (mmol/l)

22

0,6 -1,8

Bilan neuf

	Valeurs	Valeurs normales
Glycemie (mmol/l)	11	3,6-6,1
Uree (mmol/l)	4,1	2,5 - 7,5
Creatinine (μ mol/l)	199	55-120
Soduim (mmol/l)	133	135-145
Lactates (mmol/l)	22	0,6 -1,8
Bilirubine(μ mol/l)	12	<20
Gamma GT (UI/l)	22	10-50
Amylase (UI/l)	93	<100
Calcium (mmol/l)	1,94	2,1 - 2,6
ASAT(UI/L)	108	5-40
ALAT(UI/L)	75	5-40

Que reste-t-il?

Que reste-t-il?

- Valproate sodique : dépakinémié nulle

Que reste-t-il?

- Valproate sodique : dépakinémie nulle
- Isoniazide : Pas de convulsion

Que reste-t-il?

- Valproate sodique : dépakinémié nulle
- Isoniazide : Pas de convulsion
- Metformine : finalement la patiente reconnaît la metformine comme thérapeutique responsable

Que reste-t-il?

- Isoniazide : Pas de convulsion
- Metformine : finalement la patiente reconnaît la metformine comme thérapeutique responsable

Que reste-t-il?

- Metformine : finalement la patiente reconnaît la metformine comme thérapeutique responsable

Quelles options thérapeutiques

Quelles options thérapeutiques

- Alcalinisation

Quelles options thérapeutiques

- Alcalinisation
- Dialyse

Quelles options thérapeutiques

- Alcalinisation
- Dialyse
- Traitement symptomatique

Cycle des lactates

20%

20%

25%

25%

1500 mmol/j

60%

30%

Equilibre:

Lactatémie 0,5 à 1,5 mmol/l

Acidose lactique

Cohen RD, Woods HF. Lactic acidosis revisited. Diabetes 1983;32:181– 91.

Acidose lactique

- La classification des acidoses lactiques de Cohen et Woods

Cohen RD, Woods HF. Lactic acidosis revisited. *Diabetes* 1983;32:181– 91.

Acidose lactique

- La classification des acidoses lactiques de Cohen et Woods
- Type A : hyperlactatémies par hypoxie tissulaire
Diminution de DO_2 Altération de l'Ex O_2 ou de l'utilisation d' O_2

Cohen RD, Woods HF. Lactic acidosis revisited. *Diabetes* 1983;32:181– 91.

Acidose lactique

- La classification des acidoses lactiques de Cohen et Woods
 - Type A : hyperlactatémies par hypoxie tissulaire
Diminution de DO_2 Altération de l'ExO₂ ou de l'utilisation d'O₂
 - Type B1 : hyperlactatémies et maladies systémiques

Cohen RD, Woods HF. Lactic acidosis revisited. *Diabetes* 1983;32:181– 91.

Acidose lactique

- La classification des acidoses lactiques de Cohen et Woods
 - Type A : hyperlactatémies par hypoxie tissulaire
Diminution de DO_2 Altération de l' ExO_2 ou de l'utilisation d' O_2
 - Type B1 : hyperlactatémies et maladies systémiques
 - Type B2 : hyperlactatémies et intoxications

Cohen RD, Woods HF. Lactic acidosis revisited. *Diabetes* 1983;32:181– 91.

Acidose lactique

- La classification des acidoses lactiques de Cohen et Woods
 - Type A : hyperlactatémies par hypoxie tissulaire
Diminution de DO_2 Altération de l'Ex O_2 ou de l'utilisation d' O_2
 - Type B1 : hyperlactatémies et maladies systémiques
 - Type B2 : hyperlactatémies et intoxications
 - Type B3 : hyperlactatémies et augmentation des besoins en O_2

Cohen RD, Woods HF. Lactic acidosis revisited. *Diabetes* 1983;32:181– 91.

Acidose lactique physiopathologie

- La cause principale résiderait dans l'**inhibition de la néoglucogenèse** à partir de différents substrats dont le lactate, surtout en cas d'accumulation de metformine
- Ce mécanisme serait médié par
 - une **inhibition du complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale.**
 - La metformine augmente le **ratio NAD/NADH** avec une élévation du flux au travers de la pyruvate kinase.

Acidose lactique physiopathologie

- La cause principale résiderait dans l'inhibition de la néoglucogénèse à partir de
- une inhibition du complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale.
- La metformine augmente le **ratio NAD/NADH** avec une élévation du flux au travers de la pyruvate kinase.
- **respiratoire mitochondriale.**
- La metformine augmente le **ratio NAD/NADH** avec une élévation du flux au travers de la pyruvate kinase.

Régulation

<http://depts.washington.edu/hiv aids/arvae/case5/discussion.html> Texte

Régulation des lactates

<http://depts.washington.edu/hivaid/arvae/case5/discussion.html>Texte

Metformine

- La metformine augmente la production **glycolytique de lactates** au niveau **intestinal**.
- L'hyperlactatémie serait le **résultat couplé** d'une *baisse de son utilisation* et d'une *augmentation de sa production*.
- Ce désordre surviendrait à la faveur d'un **surdosage** ou d'une **défaillance d'organe**

Les classiques contre-indications à la prescription de metformine

- **Hypersensibilité** au chlorhydrate de metformine ou à l'un de ses excipients
- **Acidocétose diabétique, précoma** diabétique
- **Insuffisance rénale** ou altération de la fonction rénale (clairance de la créatinine < 60 ml/min)
- **Affections aiguës** susceptibles d'altérer la fonction rénale telles que : **déshydratation, infection grave, choc**, administration intravasculaire de produits de contraste iodés
- Maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une **hypoxie** tissulaire, telle que : *insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde récent, choc*
- **Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme** Grossesse, allaitement

J.-C. Orban et coll. Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 2006, 25, 1046–52.

Les précautions d'emploi de la metformine

- **Âge supérieur ou égal à 80 ans** (jusqu'à vérification d'une fonction rénale normale)
- **Maladie hépatique** (clinique ou biologique)
- Traitement concomitant par **médicament cationique**
- Arrêt temporaire de la metformine : si créatininémie $> 150 \mu\text{mol/l}$;
- Devant toute situation associée à une **hypoxie** (insuffisance respiratoire, sepsis, infarctus du myocarde, déshydratation) ;
- Pendant **48 heures** après **injection de produit de contraste iodé** et vérification de la fonction rénale ;
- 48 heures **avant et après chirurgie** jusqu'à reprise de l'alimentation et vérification de la **fonction rénale**.

Lalau & coll. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1989;27:285-8

J.-C. Orban et coll. Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 2006, 25, 1046-52.